

ОСТАЛОН® КАЛЬЦИЙ-Д

70 мг алендроната

600 мг кальция

400 МЕ витамина D₃

Три компонента комплексной
терапии остеопороза!



- Соответствует Европейским рекомендациям по лечению остеопороза
- Достоверно снижает риск остеопоротических переломов
- Обеспечивает высокую приверженность пациентов к лечению

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. ОСТАЛОН® КАЛЬЦИЙ-Д, Р.с. № UA/11297/01/01 от 06.01.2011 г. **Состав.** Таблетки алендроновой кислоты: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 70 мг алендроновой кислоты (в виде 91,35 мг алендроната натрия тригидрата). Таблетки кальция и витамина D₃: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 600 мг кальция (в виде 1500 мг кальция карбоната) и 400 МЕ витамина D₃ (в виде 10 мкг колекальциферола). **Фармакотерапевтическая группа.** Бисфосфонаты, комбинации. **Код АТС** M05B B05. **Показания.** Лечение остеопороза, когда показано применение таблеток алендроновой кислоты и когда необходимо применять дополнительно таблетки кальция и витамина D₃. **Таблетки алендроновой кислоты:** лечение остеопороза в постменопаузальный период с целью предупреждения переломов, в том числе компрессионных переломов шейных позвонков и головки тазобедренной кости; лечение остеопороза у мужчин с целью предупреждения переломов. **Таблетки кальция и витамина D₃:** дополнительная терапия для лечения остеопороза с таблетками алендроновой кислоты. **Противопоказания.** Применение таблеток Осталон® Кальций-Д противопоказано из-за таблеток алендроновой кислоты при повышенной чувствительности к компонентам препарата; аномалии пищевода и других факторах, затрудняющих его проходимость (ахалазия, стриктуры); неспособность больного оставаться в вертикальном положении (хотя бы сидя) в течение 30 мин; гипокальциемия; в период беременности и кормления грудью; детский или подростковый возраст. Таблетки Осталон® Кальций-Д противопоказаны из-за таблеток кальция и витамина D₃ при повышенной чувствительности к компонентам препарата; почечной недостаточности; гиперкальциемии; нефролитиазе; применении препаратов, содержащих активный витамин D; гипервитаминозе, обусловленном витамином D; первичном гиперпаратиреозе; гиперкальциемии любой этиологии. Таблетки Осталон® Кальций-Д, покрытые пленочной оболочкой, содержат соевое масло, поэтому пациентам, страдающим аллергией на сою или арахис, препарат противопоказан. **Побочные реакции.** Таблетки алендроновой кислоты по 70 мг: со стороны ЖКТ – боль в животе, диспепсия, запор, понос, метеоризм, вздутие живота, отрыжка кислой и другие; со стороны опорно-двигательного аппарата – костная, мышечная или суставная боль; со стороны нервной системы – головная боль; общие – кожная сыпь, зуд, покраснение кожи, аллергические реакции, включая крапивницу и ангионевротический отек; проходящие симптомы, напоминающие фазу острой реакции (миалгия, слабость, плохое самочувствие; редко – высокая температура тела) и др.; со стороны органов чувств – ушная, склерит и др. Таблетки кальция и витамина D₃: со стороны обмена веществ – гиперкальциемия, гиперкальциурия; со стороны ЖКТ – запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея; со стороны кожи и подкожной клетчатки – зуд, сыпь, крапивница. **Производитель.** Таблетки кальция и витамина D₃: ЗАО «Берешь Фарма», H-5005, Солонж, ул. Надышандор, 39, Венгрия. Таблетки алендроновой кислоты: ООО «Гедеон Рихтер Польша», 05-825, Гродзиск Мазовецкий, ул. Кс. Ю. Понятовского, 5, Польша. Полная информация о лекарственном препарате содержится в инструкции для медицинского применения.



Рихтер Гедеон

Основано в 1901 году

Представительство «Рихтер Гедеон» в Украине: г. Киев, ул. Тургеневская, 17-Б
Тел./факс: (044) 492-99-10, тел.: (044) 492-99-19, 492-99-11
E-mail: ukraine@richter.kiev.ua, www.richter.com.ua