



Флекцерин

(діацереїн 50 мг)



- Знижує інтенсивність болю (інгібує синтез та активність інтерлейкіну-1)
- Відновлює функцію суглобів (стимулює продукцію колагену, гіалуронової кислоти та протеогліканів)



КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД
Якість без компромісів!

Призначено для розповсюдження на семінарах та симпозіумах медичної тематики

Показання. Ревматичні захворювання суглобів (остеоартрит, остеоартроз). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату або до антрахінуу в анамнезі. **Спосіб застосування та дози.** Протягом перших 2-4 тиж. лікування Флекцерин призначають дорослим по 1 капсулі (50 мг) після прийому їжі на ніч. Починаючи з 2-4-го тижня лікування дозу препарату підвищують до 100 мг/добу за 2 прийоми (по 1 капсулі вранці та ввечері після їди). Препарат застосовують протягом тривалого періоду (не менше 6 міс.). Тривалість курсу лікування встановлює лікар індивідуально. **Побічні реакції.** Можливі диспептичні явища, діарея, біль у животі, які може змінюватися фармакокінетика діацереїну. У цих випадках рекомендується знижувати дозу до 1 капсули на добу (кліренс креатиніну <30 мг/мл). **Побічні реакції.** Можливі диспептичні явища, діарея, біль у животі, які виникають протягом 1-го місяця лікування. Інші побічні ефекти включають підвищення рівня печінкових ферментів, інтенсивне забарвлення сечі в жовтий колір, алергічні шкірні реакції (кропив'янка, свербіж).

Упаковка. По 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у паці. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Рестраційне посвідчення** МОЗ України № UA/12618/01/01 від 30.11.12.