

ФОРСАНЕК®

форсуй лікування болю та запалення



- ◆ Швидка та тривала сила дії^{1,2**}
- ◆ Зручне застосування – один раз на добу¹
- ◆ Безпечніший за традиційні НПЗП³ щодо впливу на ШКТ⁴

БІОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ
ДОВЕДЕНО*

*Оригінальному препарату еторикоксибу (досьє лікарського препарату Форсанек, data on file).

** Початок анальгезивної дії вже через 28 хвилин (згідно з інструкцією).

Форсанек®, РП № UA/18626/01/01, UA/18626/01/02, UA/18626/01/03. Діюча речовина: etoricoxib. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні препарати. Коксиди. Код АТХ M01A H05. Склад. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить еторикоксибу 60 мг або 90 мг, або 120 мг. Показання. Симптоматична терапія при остеоартриті, ревматоїдному артриті, анкілозному спондиліті, а також при болю і ознаках запалення, пов'язаних із гострим подагричним артритом. Нетривале лікування помірного післяопераційного болю, пов'язаного зі стоматологічними операціями. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини. Активна пептична виразка або активна шлунково-кишкова кровотеча. Бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, кропив'янка або алергічні реакції після застосування ацетилсаліцилової кислоти чи НПЗП. Період вагітності або годування грудьми. Тяжкі порушення функції печінки, нирок. Вік пацієнта до 16 років. Запальні захворювання кишечника. Застійна серцева недостатність (NYHA II-IV). Артеріальна гіпертензія, при якій показники артеріального тиску постійно перевищують 140/90 мм рт. ст. і недостатньо контролюються. Діагностована ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні захворювання. Побічні реакції. Розлади метаболізму і харчування: набряли/затримка рідини. З боку серця: відчуття серцебиття, аритмія. З боку судинної системи: артеріальна гіпертензія; порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака, гіпертонічний криз. З боку органів дихальної системи: бронхоспазм. З боку шлунково-кишкового тракту: біль у животі, гастрит. З боку гепатобіліарної системи: підвищення АЛАТ, АСАТ. Селективні інгібітори ЦОГ-2 були пов'язані з підвищенням ризику виникнення серйозних артеріальних тромботичних подій, включаючи інфаркт міокарда та інсульт. Категорія відпуску. За рецептом.

Наведені нижче дослідження проводилися щодо діючої речовини препарату.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Форсанек 60 мг, 90 мг, 120 мг. 2. Мальстром К. та ін. Клін Дж. Біль. 2004. Травень-Червень;20(3):147-55. [Malmstrom K et al. Clin J Pain. 2004 May-Jun;20(3):147-55]. (Тривалість анальгезивного ефекту становила >24 годин для еторикоксибу, 20,8 години для напроксену натрію, 3,6 години для ацетамінофену/кодеїну і 1,6 години для плацебо). 3. НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати. 4. Доктор Ремей та ін. Частота побічних реакцій з боку верхніх відділів ШКТ – шлунково-кишкового тракту в клінічних дослідженнях еторикоксибу порівняно з неселективними НПЗП: оновлений комбінований аналіз. [Ramey DR, et al. The incidence of upper gastrointestinal adverse events in clinical trials of etoricoxib vs. non-selective NSAIDs: an updated combined analysis. Curr Med Res Opin. 2005 May;21(5):715-22].

Зображення таблеток є художнім образом і відрізняється від оригіналу.

Інформація про лікарські засоби. Для розповсюдження на спеціалізованих медичних закладах, професійній діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкції для медичного застосування.

Gladpharm

Виробник: Кусум Хелтхер Пвт Лтд.
Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «Гледфарм ЛТД».
Тел.: (044) 495-82-88,
www.gladpharm.com