

# БИВАЛОС®

Стронция ранелат 2 г

Регенерация костной ткани — максимальная защита от переломов

Препарат первого  
выбора  
Новые Европейские  
Рекомендации

Для всех Ваших пациенток  
с остеопорозом в возрасте  
старше 50 лет

- ▶ Регенерирует кость
- ▶ Максимально защищает от:
  - переломов позвонков и бедра
  - боли в спине
  - снижения роста



Защитите Ваших  
пациенток уже  
сегодня

1 пакетик в день

Показания к применению: Лечение постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов позвонков и бедра.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к стронции ранелату или любому из вспомогательных веществ препарата.

Воздействие с другими лекарственными препаратами: Молоко и молочные продукты, а также лекарственные препараты, содержащие кальций, могут снижать биодоступность стронция на 60–70%. Поэтому прием препарата Бивалос и указанные вещества должен разделяться промежутком не менее 2 ч. Применение антиацидных препаратов может приводить к незначительному замедлению всасывания стронция ранелата, поэтому их рекомендовано применять не менее, чем через 2 ч после приема Бивалоса.

Многие из побочных явлений, связанных с приемом стронция, являются временным явлением и проходят самостоятельно без отмены препарата. Возможно возникновение реакций со стороны кожи и костно-мышечной системы. В редких случаях возможно развитие реакции гиперчувствительности тяжелой степени, сопровождающейся кожной сыпью, зозинфилией и общими симптомами. В этом случае необходимы отмена лечения без последующего возобновления и назначения глюкокортикоидов системного действия (для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией к медицинскому использованию препарата).

Особенности применения: Применение у пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин. Бивалос не рекомендован. У пациентов с нарушением функций печени и у пациентов пожилого возраста отсутствует необходимость коррекции дозы препарата Бивалос. Бивалос следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском венозных тромбоземболии (ВТЭ), включая пациентов с ВТЭ в анамнезе. Лечение таких пациентов включает необходимость мониторинга симптомов и проведение профилактики ВТЭ. Наличие в Бивалосе вспомогательного вещества аспартам может вызвать нежелательную реакцию у больных с фенилкетонурией.

Для получения более точной информации ознакомьтесь с инструкцией к медицинскому применению препарата.

Сервье Украина:  
Кiev, ul. Воровского, 24. Тел: (044) 490-34-41, факс (044) 490-34-40  
SERVIER P/c M3 України № UA/4943/01/01