

БИВАЛОС®


Стронция ранелат, 2 г

Регенерация костной ткани — самая сильная защита от переломов

Рекомендации
Ассоциации
ревматологов
Украины:
препарат 1-го
выбора¹⁰

**Для всех Ваших пациенток
с остеопорозом старше 50 лет**

- ▶ Регенерирует кость¹
- ▶ Обеспечивает самую сильную защиту от переломов позвонков и бедра²⁻⁹



1 пакетик на ночь

1. Rizzoli R., Felsenberg D., Laroche M., et al. (Osteoporosis International, 2009, № 1 V. 20: 163-186 OC 37). 2. Meunier P.J., Roux C., Seeman E., et al. N Engl J Med. 2004; 350:459-468. 3. Reginster J.Y., Seeman E., De Vernejoul M.C., et al. J. Clin Endocrinol Metab. 2005; 90:2816-2822. 4. Black D.M., Cummings S.R., Karf D.B., et al. Lancet. 1996; 348:1535-1541. 5. Harris S.T., Watts N.B., Genant H.K., et al. JAMA. 1999; 282:1344-1352. 6. Chesnut C.H. III, Skag A., Christiansen C., et al. J. Bone Miner Res. 2004; 19:1241-1249. 7. Black D.M., Delmas P.D., Eastell R., et al. N Engl J Med. 2007; 356:1809-1822. 8. Chesnut C. III, Engelhardt M., Azria M., Eur. Musculoskeletal Review 2006; Osteoporosis 79-83. 9. Mac Clung M.R., Gensens P., Miller P.D., et al. N Engl J Med. 2001; 344:333-340. 10. В.Н. Коваленко, В.В. Поворожнюк, О.П. Борткевич и соавт., Украинский Ревматологический Журнал, №3(37) 2009 (in press).

Показания к применению: лечение постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов позвонков и бедра.

Противопоказания: повышенная чувствительность к стронция ранелату или любому из вспомогательных веществ препарата.

Воздействие с другими лекарственными препаратами: молоко и молочные продукты, а также лекарственные препараты, содержащие кальций, могут снижать биодоступность стронция на 60-70%. Поэтому прием препарата Бивалос® и указанных веществ должен разделяться промежутком не менее 2 ч. Прием антацидных препаратов может приводить к незначительному замедлению всасывания стронция ранелата, поэтому их рекомендовано применять не менее, чем через 2 ч после приема Бивалоса. При применении антибиотиков группы тетрациклинов или хинолонов лечение препаратом Бивалос® следует приостановить.

Побочное действие: тошнота, диарея, головная боль. Данные эффекты выражены слабо, носят кратковременный характер и обычно проходят самостоятельно без отмены препарата. Возможно возникновение реакций со стороны кожи и костно-мышечной системы. В редких случаях возможно развитие реакции гиперчувствительности тяжелой степени, сопровождающейся кожной сыпью, эозинофилией и общими симптомами. В случае возникновения любых реакций гиперчувствительности со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки необходима отмена лечения без последующего возобновления и назначение глюкокортикостероидов системного действия (для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому использованию препарата).

Особенности применения: применение Бивалоса у пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин не рекомендовано. У пациентов с нарушением функций печени и у больных пожилого возраста отсутствует необходимость в коррекции дозы препарата Бивалос®, Бивалос® следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском венозных тромбозов (ВТЗ), включая пациентов с ВТЗ в анамнезе. Лечение таких больных включает необходимость мониторинга симптомов и проведение профилактики ВТЗ. Наличие в Бивалосе вспомогательного вещества аспартам может вызвать нежелательную реакцию у больных с фенилкетонурией.

Условия отпуска: по рецепту врача. Для получения более точной информации ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата.


SERVIER
www.servier.ua

Сервье Украина:
Киев, ул. Воровского, 24. Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40
Р.с. МЗ Украины № UA/4943/01/01