

Глюкокортикоид

№1 в мире *

Медрол

метилпреднизолон, таблетки

- таблетки 4 мг по 30 таблеток в упаковке
- таблетки 16 мг по 50 таблеток в упаковке
- таблетки 32 мг по 20 таблеток в упаковке

Солу-Медрол

метилпреднизолон сукцинат натрия, порошок для инъекций

- стерильный порошок 40 мг
- стерильный порошок 125 мг
- стерильный порошок 500 мг
- стерильный порошок 1000 мг

Депо-Медрол

метилпреднизолон ацетат, суспензия для инъекций

- суспензия для инъекций 40 мг/мл



Ваши пациенты будут Вам благодарны

* Данные IMS 3Q 2009

МЕДРОЛ (метилпреднизолон)
Таблетки 4 мг по 30 таблеток в упаковке; 16 мг по 50 таблеток в упаковке; 32 мг по 20 таблеток в упаковке.

Короткая инструкция для медицинского применения препарата.

Показания: Заболевания эндокринной системы, ревматические заболевания, коллагенозы; заболевания кожи, аллергические состояния, заболевания глаз, органов дыхания, заболевания крови, онкологические заболевания, отечный синдром, заболевания пищеварительного тракта, нервной системы, других органов и систем, трансплантация органов. **Способ применения и дозы:** Начальная доза препарата может составлять для взрослых от 4 до 48 мг метилпреднизолона в сутки, в зависимости от характера заболевания. Высокие дозы могут быть необходимы при таких заболеваниях и состояниях, как рассеянный склероз (200 мг/сут), отек мозга (200–1000 мг/сут) и трансплантация органов (до 7 мг/кг в сутки). **Противопоказания:** Системные грибковые инфекции; гиперчувствительность к веществам, которые входят в состав препарата в анамнезе. **Побочное действие:** Нарушения водно-электролитного баланса, побочные явления со стороны опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, кожные проявления, метаболические и неврологические расстройства, эндокринные, офтальмологические и иммунные нарушения. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** При одновременном применении циклоспорина и метилпреднизолона возникает взаимное угнетение метаболизма. Ацетилсалициловая кислота и НПВС в комбинации с кортикостероидами следует применять с осторожностью при лечении больных с гипопротромбинемией. **Особенности применения:** Больным, которые могут подвергнуться стрессовому влиянию на фоне кортикостероидной терапии, показано увеличение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации. На фоне кортикостероидной терапии некоторые инфекции могут протекать в стертой форме, кроме того, могут проявиться новые инфекции. **Фармакологические свойства:** Большинство показаний для применения глюкокортикоидов обусловлены их противовоспалительным, иммуносупрессивным и противоаллергическими свойствами. **Условия отпуска:** По рецепту. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Информация для врачей и фармацевтов. Регистрационное свидетельство в Украине: № П.01.03/05722, UA/2047/02/01, UA/2047/02/02, UA/2047/02/03 от 18.10.2007.

СОЛУ-МЕДРОЛ (метилпреднизолон)
Лиофилизированный порошок 40 мг, 125 мг в двухкомпонентных флаконах; 500 мг, 1000 мг во флаконах + флакон с растворителем.

Короткая инструкция для медицинского применения препарата.

Показания: Заболевания эндокринной системы, ревматические заболевания, коллагенозы, заболевания кожи, аллергические состояния, заболевания глаз, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, заболевания крови, онкологические заболевания, состояния, которые сопровождаются отеком, заболеваниями нервной системы, других органов и систем. **Способ применения и дозы:** Как дополнительная терапия при состояниях, угрожающих жизни. Солу-Медрол рекомендуется вводить в дозе 30 мг/кг массы тела, внутривенно на протяжении не менее 30 мин. Введение этой дозы можно повторить каждые 4–6 часов на протяжении двух суток. Пульс-терапия при лечении ревматических заболеваний: 1 г/сут в/в на протяжении 1–4 дней или 1 г/мес на протяжении 6 мес в/в. Подробная информация о дозировках в инструкции по применению. **Противопоказания:** Системные грибковые инфекции; гиперчувствительность к веществам, которые входят в состав препарата, в анамнезе. **Побочное действие:** Маскировка инфекционного процесса, обострение латентных инфекций, реакция гиперчувствительности, остановка сердца, бронхоспазм, развитие кушингоидного статуса, задержка натрия, задержка жидкости, психические нарушения, повышение внутричерепного давления, задняя субкапсулярная катаракта, застойная сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и гипотензия, пептическая язва, эхиноз, стероидная миопатия, нарушения менструального цикла. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Метилпреднизолон замедляет метаболизм циклоспорина. Препараты индукторы печеночных ферментов (фенобарбитал, фенитоин, рифампин) могут повышать клиренс метилпреднизолона. Ингибиторы CYP 3A4 (макролиды, триазольные противогрибковые препараты, некоторые блокаторы кальцевых каналов) могут замедлять метаболизм метилпреднизолона и тем самым снижать его клиренс. Метилпреднизолон может повышать клиренс ацетилсалициловой кислоты. Кортикостероиды могут как повышать, так и понижать эффективность пероральных антикоагулянтов. **Особенности применения:** Больным, которые могут подвергнуться стрессовому влиянию на фоне кортикостероидной терапии, показано увеличение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации. Вакцинация живой или ослабленной вакциной противопоказана пациентам, получающим иммуносупрессивные дозы кортикостероидов. На фоне кортикостероидной терапии некоторые инфекции могут протекать в стертой форме, кроме того, могут проявиться новые инфекции. **Фармакологические свойства:** Метилпреднизолон – сильнодействующее противовоспалительное стероидное средство с более выраженным противовоспалительным действием и меньшим влиянием на индукцию задержки воды и натрия по сравнению с преднизолоном. **Условия отпуска:** По рецепту. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Информация для врачей и фармацевтов. Регистрационное свидетельство в Украине: № UA/2047/01/01, UA/2047/01/02, UA/2047/01/03, UA/2047/01/04, П.06.99/00746 от 01.10.2009.

ДЕПО-МЕДРОЛ (метилпреднизолон)
Суспензия для инъекций 40 мг/мл метилпреднизолон ацетата во флаконах по 1 мл.

Короткая инструкция для медицинского применения препарата.

Показания: Эндокринные заболевания, ревматические заболевания, коллагенозы, кожные заболевания, аллергические состояния, офтальмологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания, гематологические, онкологические заболевания, отечный синдром, заболевания других органов и систем. **Способ применения и дозы:** Доза препарата для внутримышечного введения зависит от заболевания, которое подлежит терапии. Если планируется достижение длительного действия, то можно вычислить недельную дозу и ввести ее одномоментно в форме внутримышечной инъекции. Доза для внутрисуставного введения зависит от размера сустава и тяжести состояния данного больного. **Противопоказания:** Системные грибковые инфекции; гиперчувствительность к веществам, которые входят в состав препарата. Противопоказано интратекальное и внутривенное введение. **Побочное действие:** Нарушения водно-электролитного баланса, побочные явления со стороны опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, кожные проявления, неврологические, эндокринные, офтальмологические и метаболические расстройства, иммунные нарушения, местные реакции при использовании не рекомендованных путей введения. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Отмечались случаи возникновения судорог при использовании метилпреднизолона с циклоспорином. Кортикостероиды взаимодействуют преимущественно с рифампицином, фенитоином, барбитуратами, эстрогенами, кетоназолом, тропанамидом, эритромицином, салицилатами, этанкриновой кислотой, тиазидами, фуросемидом, индометацином, НПВС, циклофосфамидом, амфотерицином, противодиабетическими средствами. **Фармакологические свойства:** Депо-Медрол содержит синтетический глюкокортикоид, производное 6-метилпреднизолона – метилпреднизолон ацетат. **Условия отпуска:** По рецепту. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Информация для врачей и фармацевтов. Регистрационное свидетельство в Украине: № П.10.99/1047, UA/10030/01/01 от 21.09.2009.



За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство «Файзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн» в Украине: 02098, Киев, ул. Березняковская, 29. Тел. (044) 291-60-50
UA-MED-10-011