

БИВАЛОС®

Стронция ранелат, 2 г

Регенерация костной ткани — самая сильная защита от переломов



Для всех Ваших пациенток с остеопорозом старше 50 лет

- ✓ с факторами риска
- ✓ с болью в спине
- ✓ со снижением роста
- ✓ с переломами



Здоровая и прочная кость¹ —
самая сильная защита от переломов —
в 2 раза эффективнее любого бисфосфоната²



1 пакетик на ночь

¹Rene Rizzoli, Michel Laroche, Marc-Antoine Krieg et al. Rheumatology International, Received: 7 April 2010 / Accepted: 16 May 2010 / Published online 29 May 2010, DOI 10.1007/s00296-010-1542-y

²Johann D. Ringe, John G. Doherty, Rheumatology International, Received: 14 October 2009 / Accepted: 29 November 2009 / Published online 25 December 2009, DOI 10.1007/s00296-009-1311-y

³В.Н. Коваленко, В.В. Поворозник и соавт., Украинский Ревматологический Журнал № 3, 2009

Показания к применению: лечение постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов позвонков и бедра.

Противопоказания: повышенная чувствительность к стронции ранелату или любому из вспомогательных веществ препарата.

Возможное действие с другими лекарственными препаратами: молоко и молочные продукты, а также лекарственные препараты, содержащие кальций, могут снижать биодоступность стронция на 60–70%. Поэтому прием препарата Бивалос® и указанных веществ должен разделяться промежутком не менее 2 ч. Прием антиацидных препаратов может приводить к незначительному замедлению всасывания стронция ранелата, поэтому их рекомендовано применять не менее чем через 2 ч после приема Бивалоса. При применении антибактериальных препаратов группы тетрациклинов или хинолонов лечение препаратом Бивалос® следует приостановить.

Побочное действие: тошнота, диарея, головная боль. Данные эффекты выражены слабо, носят кратковременный характер и обычно проходят самостоятельно без отмены препарата. Возможно возникновение реакций со стороны кожи и костно-мышечной системы. В редких случаях возможно развитие реакций гиперчувствительности тяжелой степени, сопровождающейся кожной сыпью, зоэнофилией и общими симптомами. В случае возникновения любых реакций гиперчувствительности со стороны кожи и подожженной жировой клетчатки необходима отмена лечения без последующего возобновления и назначение глюкокортикоидов системного действия (для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому использованию препарата).

Особенности применения: применение Бивалоса у пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин не рекомендовано. У пациентов с нарушением функций печени и у больных пожилого возраста отсутствует необходимость в коррекции дозы препарата Бивалос®. Бивалос® следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском венозных тромбоэмболий (ВТЭ), включая пациентов с ВТЭ в анамнезе. Лечение таких больных включает необходимость мониторинга симптомов и проведение профилактики ВТЭ. Наличие в Бивалосе вспомогательного вещества аспартам может вызвать нежелательную реакцию у больных с фенилкетонурией.

Условия отпуска: по рецепту врача. Для получения более точной информации ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата.



Сервье Украина:

Кiev, ул. Воровского, 24, Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40

Р.с. МЗ Украины № UA/4943/01/01

www.servier.ua