



- **Первый ризедронат на рынке Украины!**¹
- **Значительно снижает частоту
вертебральных и невертебральных
переломов уже через 6 мес лечения**²⁻³
- **Хорошо переносится пациентами,
принимающими НПВП или имеющими
заболевания желудочно-кишечного тракта**³⁻⁴
- **Рекомендованная доза: 35 мг (1 таблетка)
в неделю. В упаковке — 4 таблетки.**⁵



1. SMD data 3Q 2010. 2. Harrington J.T. et al. Risedronate rapidly reduces the risk for nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis. *Calcif Tissue Int* 2004; 74: 129–135. 3. Harris S.T. et al. Effects of risedronate treatment on vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. Vertebral Efficacy With Risedronate Therapy (VERT) Study Group. *JAMA* 1999; 282: 1344–1352. 4. Sorensen O.H. et al. Long-term efficacy of risedronate: A 5-year placebo-controlled clinical experience. *Bone* 2003; 32: 120–126. 5. Инструкция к медицинскому применению препарата Ризендрос 35.

РС № UA/7150/01/01 от 31.10.07. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения препарата. Хранить в недоступном для детей месте. Реклама: лекарственное средство.