

БИВАЛОС®

Здоровая и прочная кость – самая сильная защита от переломов

Для всех Ваших пациенток с остеопорозом



Препарат
1-го выбора⁶

- ✓ Формирует новую и здоровую кость^{1,2}
- ✓ Восстанавливает структуру и прочность^{2,3}
- ✓ Наиболее сильно защищает от переломов^{4,5}



Новая прочность кости каждый день

1. Chapurlat R, Chavassieux P, Briyen K, et al. Osteoporosis Int. 2011; Abstract. 2. Rizzoli R, Laroche M, Krieg MA, et al. Rheumatology Int. 2010;30:1341–1348. 3. Rizzoli R, Osteoporosis Int. 2010 Abstract. 4. Ringe JD, Doherty JC. Rheumatology Int. 2010;30:883–869. 5. Cummings SR, Martin JS, McClung MR, et al. N Engl J Med. 2009;361:756–765. 6. Коваленко В.Н., и соавт. Укр. реуматол. журн. № 3. 2009.

Показания к применению: лечение постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов позвонков и бедра. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к строичии раневого или любому из вспомогательных веществ препарата. **Воздействие с другими лекарственными препаратами:** молоко и молочные продукты, а также лекарственные препараты, содержащие кальций, могут снижать биодоступность строичии на 60–70%. Поэтому прием препарата Бивалос® и указанных веществ должен разделяться промежутком не менее 2 ч. Прием антидиуретических препаратов может приводить к незначительному замедлению всасывания строичии раневого, поэтому их рекомендуется применять не менее, чем через 2 ч после приема Бивалоса. При применении антибиотиков группы тетрациклинов или хинолов лечением препаратом Бивалос® следует приостановить. Возможна возникновение реакций со стороны кожи и костно-мышечной системы. В редких случаях возможно развитие реакции гиперчувствительности тяжелой степени, сопровождающейся кожной сыпью, зондифилией и общими симптомами. В случае возникновения любых реакций гиперчувствительности со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки необходима отмена лечения без последующего возобновления и назначение глюкокортикоидов системного действия (для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому использованию препарата). **Особенности применения:** применение Бивалоса у пациентов с клиренсом креатинина, менее 30 мл/мин не рекомендовано. У пациентов с нарушенным функций печени и у больных пожилого возраста отсутствует необходимость в коррекции дозы препарата Бивалос®. Бивалос® следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском венозных тромбозов (ВТЗ), включая пациентов с ВТЗ в анамнезе. Лечение таких больных включает необходимость мониторинга симптомов и проведение профилактики ВТЗ. Наличие в Бивалосе вспомогательного вещества аспартам может вызвать нежелательную реакцию у больных с фенилкетонурией. **Условия отпуска:** по рецепту врача. Для получения более точной информации ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата.



1 пакетик в день