TEVA

Долобене гель

Зняти біль допомагає, радість руху повертає!

Формула з 3 компонентів

Швидка дія саме в місці болю*



Усуває біль, запалення, набряки*



*«Місце Долобене в лікуванні ревматичних хвороб». Шуба Н.М. НМАПО.

Δ Художнє зображення органів. Інформація призначена для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. **Долобене гель • Діюча речовина:** 100 г гелю містить гепарину натрію 50 000 МО; диметилсульфоксиду 15 г; декспантенолу 2,5 г. **Форма випуску.** Гель. **Фармакотерапевтична група.** Засоби для місцевого застосування при болю у суглобах та м'язах. **Код АТС** М02А Х. **Показання до застосування.** Долобене гель застосовують із метою лікування: травм (у тому числі спортивних), гематом, ушкоджень м'язів, періартикулярних структур або суглобів (без ураження шкіри); тендиніту та тендовагініту, бурситу, плечолопаткового періартриту та епікондиліту плеча (патологічна основа клінічного синдрому «лікоть тенісиста»); гострої невралгії. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату; виражені порушення функції печінки та/чи нирок; бронхіальна астма; виражені порушення з боку серцево-судинної системи (виражена стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт, виражений загальний атеросклероз); трофічні виразки ніг, що кровоточать, відкриті та/або інфіковані рани, геморагічний діатез, пурпура, тромбоцитопенія, гемофілія, схильність до кровотеч; коматозні стани, глаукома, катаракта. **Побічні реакції.** Зумовлені дією диметилсульфоксиду: запаморочення, безсоння, адинамія, дерматит, бронхоспазм, нудота, блювання. Також можливі тимчасові реакції у вигляді почервоніння, свербежу, відчуття печіння у ділянці аплікації, незначного запаху часнику з рота. Зміна смакових відчуттів, що іноді спостерігається одразу після застосування гелю, зазвичай, минає за кілька хвилин після його застосування. Зумовлені дією декспантенолу: контактний дерматит, алергічний дерматит, екзема, висипання, подразнення шкіри та пухирі. Зумовлені дією гепарину: припухлість шкіри, шкірний висип, геморагії, іноді — виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів, що швидко минають після припинення застосування препарату. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні побічні реакції. В окремих випадках можуть виникнути алергічні реакції (наприклад кропив'янка та набряк Квінке). **Умови відпуску.** Без рецепта. **Р.П. МОЗ України:** № UA/5565/01/01 від 11.10.2011. **Виробник.** Меркле ГмбХ, Німеччина (Заявник: ратіофарм Інтернешнл ГмбХ, Німеччина). Інформація призначена для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики для медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Затверджено: вересень, 2012 р. • ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: вул. Фізкультури, 30-В, Київ, 03680 • www.teva.ua