



мидокалм®

толперизон

снова станьте собой!



Рихтер Геден

Основано в 1901 году

www.richter.com.ua

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.

МИДОКАЛМ. Р.с. № UA/7535/01/01, UA/7535/02/01, UA/7535/02/02. **Состав.** 1 таблетка по 50 мг содержит 50 мг толперизона гидрохлорида; 1 таблетка по 150 мг содержит 150 мг толперизона гидрохлорида; 1 мл раствора содержит 100 мг толперизона гидрохлорида и 2,5 мг лидокаина гидрохлорида. **Фармакотерапевтическая группа.** Миорелаксанты с центральным механизмом действия. **Код АТС.** М03ВХ04. **Показания к применению.** Спастика и гипертонус поперечнополосатых мышц, возникающих в результате органических заболеваний нервной системы; мышечный гипертонус, спазм при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; реабилитация после ортопедических и травматологических операций; заболевания, сопровождающиеся спазмом артерий и нарушением иннервации сосудов; болезнь Литтла и энцефалопатии у детей, сопровождающихся дистонией. **Побочное действие.** Мышечная слабость, головная боль, гипотензия, тошнота, рвота, ощущение дискомфорта в животе, что обычно устраняется при снижении дозы. В одиночных случаях возможны реакции повышенной чувствительности. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; период кормления грудью, относительное противопоказание — беременность, главным образом I триместр. **Условия отпуска.** По рецепту. **Производитель.** ОАО «Геден Рихтер», Н-1103 Будапешт, ул. Демери, 19—21, Венгрия.

Полная информация о лекарственном средстве содержится в инструкции для медицинского применения препарата.