

**ЕНБРЕЛ працює інакше:
це сприяє довготривалим перевагам в ефективності
лікування Ваших пацієнтів**

Енбрел®
етанерцепт

**ЕНБРЕЛ — розчинний рецептор ФНП* —
імітує дію природних рецепторів ФНП^{1,2}**

**Не потрібно збільшувати дозу
або частоту прийому^{1,2}**

- Розчинний рецептор ФНП
- Зручний спосіб введення



*ФНП - фактор некрозу пухлини

Література: 1. Інструкція до медичного застосування Енбрел. Реєстраційне посвідчення UA/13011/01/01 від 03.07.2013 2. Scallon R, Cai A, Solowski N, et al. Binding and functional comparisons of two types of tumor necrosis factor antagonists. J Pharmacol Exper Ther. 2002;301:418-426.



За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво «Файзер Біч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Україні:
03680, м. Київ вул. Амосова, 12. Тел. (044) 291-60-50.
WUKENB0213006



Енбрел®
етанерцепт

Енбрел® (етанерцепт, рекомбінантний химерний білок р75Fc) 25 або 50 мг етанерцепту у розчині для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці/ручці у комплекті з розчинником та стерильним комплектом для ін'єкцій № 4 у пластиковому контейнері.

Коротка інструкція для медичного застосування.

Показання до застосування. Ревматоїдний артрит: у комбінації з метотрексатом, коли відповідь на базисну терапію недостатня, як монотерапія при непереносимості метотрексату, чи коли тривале лікування метотрексатом не потрібне, також для лікування тяжкого активного та прогресуючого ревматоїдного артриту у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували терапію метотрексатом; поліартрикулярний ювенільний ідіопатичний артрит у дітей та підлітків у віці від 2 років, у яких спостерігається недостатня ефективність або непереносимість метотрексату; псоріатичний артрит активний та прогресуючий і випадках недостатньої відповіді на базисну терапію; тяжкий активний анкілозуючий спонділіт у разі недостатньої ефективності традиційної терапії; помірний або тяжкий бляшковий псоріаз із протипоказаннями та непереносимістю іншої системної терапії, або якщо це лікування було неефективним; лікування хронічного тяжкого бляшкового псоріазу у дітей та підлітків у віці від 6 років, у яких при використанні інших методів системної терапії або фототерапії не було досягнуто достатнього контролю над перебігом захворювання або спостерігалася непереносимість такого лікування. **Спосіб застосування та дози.** Препарат вводять підшкірно, перед застосуванням нагріти до кімнатної температури (залишити при кімнатній температурі на 10-15 хв). Рекомендована доза — 25 мг 2 рази в тиждень або 50 мг 1 раз на тиждень. При бляшковому псоріазі аналогічно, або альтернативно можна застосовувати 50 мг 2 рази на тиждень не більше 12 тиж. При поліартрикулярному ювенільному ідіопатичному артриті у дітей у віці від 2 років — доза 0,4 мг/кг маси тіла (максимальна разова доза 25 мг) 2 рази на тиждень. При бляшковому псоріазі у дітей у віці від 6 років — доза 0,8 мг/кг (максимальна разова доза 50 мг) 1 раз на тиждень не більше 24 тиж. **Протипоказання.** Падивлена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Сепсис або ризик виникнення сепсису. Активні інфекційні процеси, включаючи хронічні або локалізовані інфекції. **Побічна дія.** Інфекції, алергічні реакції, зуд, реакції у місці введення. **Особливості застосування.** З обережністю у пацієнтів із рецидивуючими або хронічними інфекціями, при гепатиті В та С, зловживаннях новонароджених та гематологічних порушеннях в анамнезі, не можна починати лікування при активному туберкульозі, не можна застосовувати живі вакцини одночасно з лікуванням. Для більш детальної інформації дивись повну інструкцію. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Подане застосування з анакірою, абатацептом та сульфалазіном не можна рекомендується. Не слід змішувати Енбрел з іншими лікарськими засобами. **Фармакологічні властивості.** Етанерцепт — химерний білок рецептора фактора некрозу пухлини людини та р75Fc, отриманий за технологією рекомбінантної ДНК методом генної інженерії. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Реєстраційне свідоцтво** № UA/13011/01/01 від 03.07.2013.

Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначена для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозиумах на медичну тематику. Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією.

За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво «Файзер Біч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Україні: 03680, Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 291-60-50.