

Стронцію ранелат, 2 г

✓ біль та скутість в суглобах^{2,3}

Покращує якість життя

1. Поворозник В.В., Григорьева Н.В. Новое в лечении больных с остеоартрозом коленных суставов: результаты рандомизированного исследования двойного слепого плацебо-контролируемого исследования/Боль. Суставы. Позвоночник, 2012, № 2. 2. Інструкція для медичного застосування препарату Стронум. 3. Rejnster J., Badurski J., et al. Efficacy and safety of strontium ranelate in the treatment of knee osteoarthritis: results of a double-blind, randomised placebo-controlled trial/Ann. Rheum. Dis., 2012, № 1.

Ресстраційне посвідчення № UA/12836/01/01 від 08.04.2013 (інформація зазначена з урахуванням змін, які проходять процес ресстрації).

Спеціалісти у галузі охорони здоров'я зобов'язані повідомляти через національну систему звітності про будь-які випадки побічних реакцій, пов'язаних із прийомом Стромосу.

[illegible]

Молочних продуктів, а також лікарських препаратів, які містять кальцій, і при цьому Стромосю необхідно дотримуватися інтервалу не менше 2 год. **УПАКОВКА** - Саше з алюмінієвої фольги, ПВХ-плівки та паперу. По 21 Стромосю.

У разі отримання питань відносно лікарських засобів просимо звертатися у представництво компанії «ЛЕ Лаб»
* для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування препарату.



Представництво Ле Лаборатуар Серв'є в Україні:
01054, Київ, вул. Воровського, 24, тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40

Для додаткової інформації відвідайте сайт www.servier.ua

1 саше на день