

Німесил[®]

німесулід

30 пакетиків з гранулятом
для приготування суспензії

100 мг у кожному пакетикі
по 100 мг два рази на добу

курс лікування до 15 днів



висока гастроінтестинальна безпека¹

ефективне зниження PGE_2 , IL-1, IL-6, субстанції P²

додаткове блокування колагенази³

Інформація про лікарський препарат для фахівців охорони здоров'я та співробітників аптек.

Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні засоби. **Показання.** Лікування гострого болю. Первинна дисменорея. **Протипоказання.** Відома підвищена чутливість до німесуліду або до будь-якого компонента препарату. Гіперергічні реакції, які мали місце в минулому (бронхоспазм, риніт, кропив'янка) у зв'язку із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти чи інших нестероїдних протизапальних препаратів. Гепатотоксичні реакції на німесулід, які мали місце в минулому. Виразка шлунка чи дванадцятипалої кишки у фазі загострення, рецидивуючі виразки чи кровотечі у травному тракті, цереброваскулярні кровотечі або інші ураження, які супроводжуються кровотечами. Тяжкі порушення згортання крові. Тяжка серцева недостатність. Тяжка ниркова недостатність. Печінкова недостатність. Діти віком до 12 років. Третій триместр вагітності та період годування грудьми. Підвищена температура тіла та гриппоподібні симптоми, підозра на гостру хірургічну патологію. Не застосовувати одночасно з іншими препаратами, що потенційно можуть бути причиною гепатотоксичних реакцій. Алкоголізм та наркотична залежність. **Побічні реакції.** Анемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, пурпура, підвищена чутливість, анафілаксія, гіперкаліємія, відчуття страху, нервозність, нічні жахливі сновидіння, запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (синдром Рейса), нечіткий зір, вертиго, тахікардія, гіпертензія, геморагія, лабільність артеріального тиску, приливи, задишка, астма, бронхоспазм, діарея, нудота, блювання, запор, метеоризм, гастрит, біль у животі, диспепсія, стоматит, випорожнення чорного кольору, кровотечі в травному тракті, виразка та перфорація дванадцятипалої кишки/шлунка, гепатит, миттєвий (фульмінантний) гепатит, із летальним кінцем у тому числі, жовтуха, холестаза, свербіж, висип, еритема, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, поліформна еритема, синдром Стівенса—Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, дизурія, гематурія, затримка сечовипускання, ниркова недостатність, олігурія, інтерстиціальний нефрит, нездужання, астения, гіпотермія, підвищення рівня печінкових ферментів.

Повний перелік показань, протипоказань, побічних ефектів, а також докладну інформацію про препарат можна знайти в інструкції для медичного застосування.

¹ J.R. Laporte, L. Ibanez, X. Vidal, L. Vendrell and R. Leone. Upper Gastrointestinal Bleeding Associated with the Use of NSAIDs. Drug Safety 2004; 27 (6): 411-420.

² M. Bianchi, M. Broggin, P. Balzarini, S. Franchi, P. Sacerdote. Effects of nimesulide on pain and on synovial fluid concentrations of substance P, interleukin-6 and interleukin-8 in patients with knee osteoarthritis: comparison with celecoxib. Int J Clin Pract. 2007 Aug;61(8):1270-7. Epub 2007 Jun 22.

³ Modified after Barrachini et al., Can nonsteroidal antiinflammatory drugs act as metalloprotease modulators? An invitro study of inhibition of collagenase activity. J. Pharm. Pharmacol., 50, 1417-1423, 1998.