



ЛЕФНО®

Лефлуномід

таблетки 20 мг № 30

LEFNO®
Leflunomide

ПОВЕРНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ РУХІВ

■ Зберігає та достовірно покращує якість життя пацієнтів із ревматоїдним та псоріатичним артритом

■ Зменшує вираженість позасуглобових проявів і клінічних симптомів ревматоїдного та псоріатичного артриту

■ Запобігає порушенню функції та достовірно сповільнює прогресування рентгенологічної деструкції суглобів

■ Однаково ефективний у пацієнтів із раннім (тривалість менше 2 років) та пізнім (більше 2 років) ревматоїдним артритом



Виробник:
«Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД»
Tel.: (044) 495-82-88



Кожна таблетка, вкрита оболонкою, містить 20 мг лефлуноміду Барвник титану діоксид (E 171)

Kusum Healthcare
Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД.
SP 289(A), Rico Indl. Area,
Chopaniki, Bhiwadi (Raj.), India.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

ЛЕФНО® Р.П. МОЗ України №UA/6367/01/02 від 28.04.2012 р. Склад. 1 таблетка містить лефлуномід 20 мг. **Лікарська форма.** Таблетки. **Фармакотерапевтична група.** Імуносупресори. **Код ATC.** L04A A13. **Показання до застосування.** Активна фаза ревматоїдного артриту у дорослих пацієнтів; активна фаза псоріатичного артриту. Протипоказання. Підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі із синдромом Стівенса — Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліфірмною еритемою) чи до інших компонентів препарату. Порушення функції печінки. Тяжкі імунодефіцитні стани (у тому числі СНІД). Виражені порушення кістково-мозкового кровотворення або виражена анемія, лейкопения, нейтропенія чи тромбоцитопенія внаслідок інших причин, не пов'язаних із ревматоїдним чи псоріатичним артритом. Інфекції тяжкого перебігу. Помірна чи тяжка ниркова недостатність (внаслідок незначного досвіду клінічних спостережень у цій групі хворих). Тяжка гіпотропітність (у тому числі при нефротично-му синдромі). **Побічні ефекти.** Інфекції та інвазії: рідко поширені — тяжкі інфекції, включаючи сепсис (у тому числі випадки з летальним кінцем). З боку системи крові: поширені — лейкопенія (лейкоцити <2 г/л); непоширені — анемія, тромбоцитопенія; рідко поширені — панцитопенія, лейкопенія (лейкоцити <2 г/л), еозинофілія. З боку імунної системи: поширені — алергічні реакції легкого ступеня. З боку обміну речовин: поширені — зростання рівня креатинфосфокінази; непоширені — гіпокаліємія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія; рідко поширені — зростання рівня лактатдегідрогенази. **Психічні порушення:** непоширені — тривожний стан, з боку нервової системи: поширені — парестезії, головний біль, запаморочення. З боку серцево-судинної системи: поширені — помірне підвищення артеріального тиску; рідко поширені — значне підвищення артеріального тиску. З боку дихальної системи: рідко поширені — інтерстиціальна пневмонія (у тому числі випадки з летальним кінцем). З боку трахеального тракту: поширені — діарея, нудота, бліварення, біль у животі, ураження слізової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки); рідко поширені — порушення смаку. З боку гепатобіліарної системи: поширені — зростання рівня печінкових трансаміназ (особливо аланінаміотрансферази), рідше — зростання рівня гамма-глутамон-трансферази із лужної фосфатази, гіперблірубінемія; рідко поширені — гепатит, жовтяниця, холестаз. З боку шкіри та придатків: поширені — підвищено випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (у тому числі макулопапулозні), свербіж, сухість шкіри; рідко поширені — крапив'янка. З боку кістково-м'язової системи: поширені — тендосиновіт; непоширені — розрив сухожиль. Загальні порушення: поширені — анорексія, втрата маси тіла (зазвичай незначна), астенія. **Назва і місцезнаходження виробника.** КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД. СП 289 (А), Ріко Индл. Ареа, Чопанікі, Бхіваді (Радж.), Індія. **Категорія відпуску.** За рецептром.

Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.