


**Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.**

Р.с. № UA/3421/01/02 от 30.07.2010 г.  
**Состав:** 1 капсула содержит 300 мг габапентина. **Форма выпуска.** Капсулы по 300 мг № 50 и 100. **Фармакотерапевтическая группа.** Противосудорожные препараты. **Код АТС.** N03AX12. **Фармакологические свойства.** Точный механизм действия неизвестен. Габапентин структурно связан с гамма-аминомасляной кислотой. Габапентин связывается с пептидсвязывающими участками вольтажчувствительных кальциевых каналов и, как результат, модулирует высвобождение нейротрансмиттеров. **Показания:** лечение при периферической нейропатической боли (болевой диабетической нейропатии и постгерпетической невралгии у взрослых); эпилепсии (в качестве адъювантной терапии при купировании парциальных приступов со вторичной генерализацией или без у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет и в качестве монотерапии при парциальных приступах со вторичной генерализацией или без у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет). **Применение.** Габапентин можно принимать независимо от приема пищи. Схема дозирования — начальное титрование: 1-й день — 300 мг 1 раз в сутки; 2-й день — 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день — 300 мг 3 раза в сутки. Возможно назначение начальной дозы 900 мг/сут, распределенной на 3 приема. Со временем, в зависимости от индивидуальной реакции, дозу можно повышать пошагово по 300 мг/сут каждые 2–3 дня до максимальной дозы 3600 мг/сут. Минимальное время достижения дозы 1800 мг/сут составляет 1 нед, дозы 2400 мг/сут — в целом 2 нед, дозы 3600 мг/сут — в целом 3 нед. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных компонентов препарата. **Побочные эффекты:** лейкопения, анорексия, повышение аппетита, спутанность сознания и эмоциональная лабильность, сонливость, атаксия, судороги, гиперкинезы, дизартрия, амнезия, тремор, бессонница, головная боль, парестезия, гипестезия, нарушение координации, нистагм, амблиопия, диплопия, головокружение, артериальная гипертензия, бронхит, фарингит, рвота, тошнота, диарея, боль в животе, диспепсия, запор, сухость во рту или глотке, метеоризм, отек лица. **Условия хранения:** при температуре не выше 25 °С. **Упаковка:** 10 двухцветных желатиновых капсул в блистере, 5 или 10 блистеров в картонной упаковке.

**Производитель.** ОАО «Гедеон Рихтер», Н-1103, ул. Демреи, 19–21, Будапешт, Венгрия.

**Полная информация о лекарственном средстве содержится в инструкции для медицинского применения.**



БОЛЬ ОТСТУПАЕТ



# ТЕБАНТИН®

габапентин



Р.с. № UA/3421/01/02 от 30.07.2010 г.

Дни	Начальная доза			Титрование			Поддерживающая доза в последующие дни (мг)
	1-й	2-й	3-й	4-6-й	7-10-й	11-14-й	
Утро			1 капсула	1 капсула	1 капсула	2 капсулы	600–1200
День		1 капсула	1 капсула	1 капсула	2 капсулы	2 капсулы	600–1200
Вечер	1 капсула	1 капсула	1 капсула	2 капсулы	2 капсулы	2 капсулы	600–1200



Представительство  
 «Рихтер Гедеон» в Украине  
 Киев, ул. Тургеневская, 17 Б.  
 Тел./факс: (045) 492-99-10, тел.: (045) 492-99-19,  
 e-mail: ukraine@richter.kiev.ua,  
 www.richter.com.ua

Рихтер Гедеон

Основано в 1901 году