

ТИВОРТИН®

Незаменимый донатор оксида азота



У вас нет времени болеть

Информация о лекарственном препарате Тивортин® и Тивортин® аспармат. **Тивортин®** (раствор для инфузий): 1 мл раствора содержит 42 мг аргинина гидрохлорида (в 100 мл содержится 20 ммоль аргинина и 20 ммоль хлоридов). Код АТС. B05X B01. **Тивортин® аспармат**. 5 мл раствора содержит L-аргинина аспармат 1 г (L-аргинина — 0,57 г, кислоты аспарагиновой — 0,43 г). Код АТС. C01E. **Показания к применению.** Заболевания сердечно-сосудистой системы: в комплексной терапии при ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, атеросклерозе сосудов сердца, артериальной гипертензии, атеросклерозе периферических сосудов, гиперхолестеринемии, состоянии после перенесенного острого инфаркта миокарда, миокардиопатии, диабетической ангиопатии. Заболевания нервной системы: атеросклероз сосудов головного мозга, состояние после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. Заболевания дыхательной системы: хроническая обструктивная болезнь легких, интерстициальная пневмония, идиопатическая легочная гипертензия, хроническая постэмболическая легочная гипертензия. Заболевания пищеварительной системы: острый и хронический гепатит различной этиологии, печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, вызванная гипераммониемией. Заболевания других систем организма: задержка развития плода и преэклампсия, метаболический алкалоз, гипоксическое и астенческое состояние. **Противопоказания.** Гиперчувствительность к препарату, тяжелые нарушения функции почек, гиперхлоремический ацидоз, детский возраст (до 18 лет). **Способ применения и дозы.** **Тивортин®. Раствор для инфузий.** Препарат вводится внутривенно капельно со скоростью 10 капель в минуту за первые 10–15 мин, затем скорость введения можно увеличить до 30 капель в минуту. Суточная доза препарата составляет 100 мл. При тяжелых нарушениях кровообращения в центральных и периферических сосудах, гипоксии, астеническом состоянии доза препарата может быть повышена до 200 мл/сут (по 100 мл 2 раза в сутки). Максимальная скорость введения не должна превышать 20 ммоль/ч. Для детей в возрасте до 12 лет доза препарата составляет 5–10 мл на 1 кг массы тела в сутки. Курс терапии: 7–10 дней. **Тивортин® аспармат. Раствор для перорального применения.** Внутрь принимают во время еды. При ишемической болезни сердца, атеросклерозе сосудов сердца и головного мозга, атеросклерозе периферических сосудов, диабетической ангиопатии — по 5 мл (1 мерная ложка — 1 г препарата) 3–8 раз в сутки, гиперхолестеринемии, состоянии после перенесенного острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, артериальной гипертензии — по 5 мл 3–6 раз в сутки. При хронической обструктивной болезни легких, интерстициальной пневмонии, идиопатической легочной гипертензии, хронической постэмболической легочной гипертензии, остром и хроническом гепатите различной этиологии, печеночной недостаточности, печеночной энцефалопатии — по 5 мл 3–6 раз в сутки. При гипоксическом и астеническом состоянии, иммунокоррекции при снижении функции вилочковой железы — по 5 мл 4–8 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 8 г. Продолжительность курса лечения — 8–15 дней, при необходимости курс лечения повторяют. **Побочные реакции.** Редко — ощущение легкого дискомфорта в желудке и кишечнике, тошнота непосредственно после применения препарата, которые исчезают самостоятельно. Головная боль, ощущение жара, фибрит в месте введения раствора. Редко — аллергические реакции. Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. РС МЗ Украины № УА/8954/01/01 от 13.09.2013 г., № УА/9941/01/01 от 18.08.2009 г. Перед применением следует обязательно ознакомиться с инструкцией по применению и общими предостережениями. Хранить в недоступном для детей месте. Маркет разработан: ООО «Бай-Брай Медиа». Фото: Shutterstock.com/

Форма выпуска:

L-аргинина гидрохлорид (42 мг/мл), раствор для инфузий, по 100 мл
L-аргинина аспармат (1 г/5 мл), раствор для перорального применения,
во флаконах по 100 и 200 мл

ООО «ЮРИЯ-ФАРМ»

Адрес: 03680, Киев, ул. Н. Амосова, 10
Тел./факс: +38 (044) 275-01-08; 275-92-42
E-mail: mtk@uf.ua
www.tivortin.com; www.uf.ua

