



ЛЕФНО®

Лефлуномід

таблетки 20 мг № 30

LEFNO®
Leflumide

ПОВЕРНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ РУХІВ

■ Зберігає та достовірно покращує якість життя пацієнтів із ревматоїдним та псоріатичним артритом

■ Зменшує вираженість позасуглобових проявів і клінічних симптомів ревматоїдного та псоріатичного артриту

■ Запобігає порушенню функції та достовірно сповільнює прогресування рентгенологічної деструкції суглобів

■ Однаково ефективний у пацієнтів із раннім (тривалість менше 2 років) та пізнім (більше 2 років) ревматоїдним артритом



Виробник:

«Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД»

Тел.: (044) 495-82-88

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

ЛЕФНО® Р. П. МОЗ України № UA/6367/01/02 від 28.04.2012 р. **Склад.** 1 таблетка містить лефлуноміду 20 мг. **Лікарська форма.** Таблетки. **Фармакотерапевтична група.** Імуносупресори. **Код АТС.** L04A A13. **Показання до застосування.** Активна фаза ревматоїдного артриту у дорослих пацієнтів; активна фаза псоріатичного артриту. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі із синдромом Стівенса — Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліформною еритемою) чи до інших компонентів препарату. Порушення функції печінки. Тяжкі імунodefіцитні стани (у тому числі СНІД). Виражені порушення кістково-мозкового кровотворення або виражена анемія, лейкопенія, нейтропенія чи тромбоцитопенія внаслідок інших причин, не пов'язаних із ревматоїдним чи псоріатичним артритом. Інфекції тяжкого перебігу. Помірна чи тяжка ниркова недостатність (внаслідок незначного досвіду клінічних спостережень у цій групі хворих). Тяжка гіпопротеїнемія (у тому числі при нефротичному синдромі). **Побічні ефекти.** **Інфекції та інвазії:** рідко поширені — тяжкі інфекції, включаючи сепсис (у тому числі випадки з летальним кінцем). **З боку системи крові:** поширені — лейкопенія (лейкоцити <2 г/л); не поширені — анемія, тромбоцитопенія; рідко поширені — панцитопенія, лейкопенія (лейкоцити <2 г/л), еозінофілія. **З боку імунної системи:** поширені — алергічні реакції легкого ступеня. **З боку обміну речовин:** поширені — зростання рівня креатинфосфокінази; не поширені — гіпокаліємія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія; рідко поширені — зростання рівня лактатдегідрогенази. **Психічні порушення:** не поширені — тривожний стан. **З боку нервової системи:** поширені — парестезії, головний біль, запаморочення. **З боку серцево-судинної системи:** поширені — помірне підвищення артеріального тиску; рідко поширені — значне підвищення артеріального тиску. **З боку дихальної системи:** рідко поширені — інтерстиціальна пневмонія (у тому числі випадки з летальним кінцем). **З боку травного тракту:** поширені — діарея, нудота, блювання, біль у животі, ураження слизової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки); рідко поширені — порушення смаку. **З боку гепатобілярної системи:** поширені — зростання рівня печінкових трансаміназ (особливо аланінамінотрансферази), рідше — зростання рівня гамма-глутатіон-трансферази і лужної фосфатази, гіпербілірубінемія; рідко поширені — гепатит, жовтяниця, холестаз. **З боку шкіри та придатків:** поширені — підвищене випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (у тому числі макулопапулезні), свербіж, сухість шкіри; рідко поширені — кропив'янка. **З боку кістково-м'язової системи:** поширені — тендосиновіт; не поширені — розрив сухожил'я. **Загальні порушення:** поширені — анорексія, втрата маси тіла (зазвичай незначна), астенія. **Назва і місцезнаходження виробника.** КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД, СП 289 (А), РІКО Індл. Ареа, Чопанкі, Бхіваді (Радж.), Індія. **Категорія відпуску.** За рецептом.

Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.