




АЕРТАЛ®
ацеклофенак

Нове покоління золотого стандарту НПЗП



ПЕРЕНОСИМІСТЬ

Аертал® має високий рівень переносимості з боку ШКТ внаслідок мінімального пригнічення простагландинів слизової оболонки шлунка^{1,2}

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Аертал® високоефективний завдяки своєму багатофакторному механізму дії на цілий ряд медіаторів запалення^{3,4}.
Має хондропротекторну дію⁵

КОМФОРТНІСТЬ

Загальна кількість пацієнтів, які пройшли лікування, становила 96,6 мільйонів більше ніж за 15 років.
Понад 90% пацієнтів (93,5%) дали позитивну оцінку препарату⁶

¹Yanagawa A, et al. (1998) Endoscopic study of the damaging action of diclofenac Na, aceclofenac and its placebo on the gastric and duodenal mucosa. Jap J. Rheumatol. 8:249-59. ²Huskisson E, et al. (2000) A large prospective open-label, multicentre SAMM study, comparing the safety of aceclofenac in patients with rheumatic disease. Eur. J. Rheumatol Inflamm.; Vol.17-Issue 1:1-7. ³Diaz C, Rodriguez de la Serna A, Gell, C, et al. (1996) Efficacy and tolerability of aceclofenac vs. diclofenac in the treatment of knee Osteoarthritis. A multicenter study. Eur J Rheumatol Inflamm.; 16(1): 17-22. ⁴Kornaroff D, Maisenbacher J, Bowller J, et al. (1996) The efficacy and tolerability of aceclofenac compared to indometacin in patients with Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Int; 15:225-30. ⁵Dingle J, et al., (1999) The effects of NSABP on the matrix of human articular cartilages. Z. Rheumatol; 58 (3):125-129. ⁶Bon L, et al., (2000) Effects of diclofenac, aceclofenac and meloxicam on the metabolism of proteoglycans and hyaluronan in osteoarthritic human cartilage. Br. J. Pharmacol.; 131 (7): 1413-1421. ⁷Lemmel E.M., et al., (2002) Patient and physician satisfaction with aceclofenac: results of the European Observational Cohort Study (experience with aceclofenac for inflammatory pain in daily practice). Aceclofenac is the treatment of choice for patients and physicians in the management of inflammatory pain. Curr. Med. Res. Opin.; 18 (3): 146-153.

Рн. № UA/5359/01/01 від 26.10.2011 р.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.
АЕРТАЛ®. Рп. № UA/5359/01/01 від 26.10.2011 р. Склад 1 таблетка містить 100 мг ацеклофенаку. Нестероїд протизапальні та противимігматичні препарати (НПЗП). Порядні огортові кислота та споріднені речовини. Код ATC: М01A B16. Показання. Симптоматична терапія болового синдрому та запалення при остеоартріті, ревматоїдному артриті та ахилловому спонділіті, а також при інших захворюваннях опорно-рухового апарату, що супроводжуються болем (наприклад плечеволітоватковий гелепріфт або поസупобілів ревматізм). Як анальгетик при стаханах, що супроводжуються болем (включочачи біль у поперековому відділі, зубний біль і першина (функциональну) дисменорею). Протипоказання. Пацієнтам зі шлунково-кишковою кровотечею або хроною візиєю в асаннізі; поєданням з попередньою терапією НПЗП; наявністю супутньої пептичної візики або хроною візиєю в даний час або в асаннізі; пацієнтам з активним кровотечею чи порушенням згортання крові; особам із тяжкою пінічкою чи нирковою недостатністю; пацієнтам із тяжкою серцевою недостатністю; особам із гіперчувствливістю до ацеклофенаку або будь-якого компонента препарату; а також пацієнтам, в яких ацетилсалицилова кислота або НПЗП спричиняють напади астми, гострій риніт, ангионевротичний набряк або кропотінну, а також пацієнтам із гіперчувствливістю до цих препаратів. Застосування препарата в останній триместр вагітності протипоказано. Не рекомендовані для застосування у дітей. Побіні реакції. З боку ШКТ — пептичні виразки, перфорації чи шлунково-кишкові кровотечі; нудота, блівання, діарея, метеоризм, запор, диспепсія, викинення різновидів висипу, дербік, кропивна язика, виразкові стоматіт, затвердіння коліти та хвороби кролів; гастрит, панкреатіт. Реакції іннервальної системи — неспецифічні алергічні реакції та анафілаксія, реактивні реакції з боку органів дихання, які включають астму, погріщені перебіг астми, бронхоспазм і диспесію або різноманітні ширини пропвів, викинення різновидів висипу, дербік, кропивна язика, виразкові стоматіт, затвердіння коліти та хвороби кролів.

Виробник: ВАТ «Ріхтер Ріхтер», Будапешт, Угорщина, за ліцензією Аміран Г.Г., Швейцарія.

Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.



РІХТЕР ГЕДЕОН

Засновано у 1901 році

Представництво «Ріхтер Гедеон» в Україні: 01054, Київ, вул. Тургеневська, 17Б.

Тел./факс: +38 (044) 492-99-10, тел.: +38 (044) 492-99-19/11, e-mail: ukraine@richter.kiev.ua www.richter.com.ua