



ЛЕФНО®

Лефлуномід

таблетки 20 мг № 30

LEFNO®
Leflunomide

ПОВЕРНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ РУХІВ

■ Зберігає та достовірно покращує якість життя пацієнтів із ревматоїдним та псоріатичним артритом

■ Зменшує вираженість позасуглобових проявів і клінічних симптомів ревматоїдного та псоріатичного артури

■ Запобігає порушенню функції та достовірно сповільнює прогресування рентгенологічної деструкції суглобів

■ Однаково ефективний у пацієнтів із раннім (тривалість менше 2 років) та пізнім (більше 2 років) ревматоїдним артритом



Виробник:
«Кусум Хелтхер ПВТ. ЛТД»
Tel.: (044) 495-82-88



Кожна таблетка, вкрита оболонкою, містить 20 мг лефлуноміду
Барвник титан діоксид (E 171)

Kusum Healthcare
Кусум Хелтхер ПВТ. ЛТД.
SP 289(A), Relco Indl. Area,
Choranki, Bhivadi (Raj.), India.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.
ЛЕФНО® Р. П. МОЗ України № UA/6367/01/02 від 28.04.2012 р. Склад. 1 таблетка містить лефлуноміду 20 мг. **Лікарська форма.** Таблетки. **Фармакотерапевтична група.** Імуносупресори. **Код АТС.** L04A A13. **Показання до застосування.** Активна фаза ревматоїдного артури у дорослих пацієнтів; активна фаза псоріатичного артури. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі із синдромом Стівенса — Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліфіброзною еритемою) чи до інших компонентів препарату. Порушення функції печінки. Тяжкі імунодефіцитні стани (у тому числі СНІД). Виражені порушення кістково-мозкового кровотворення або виражена анемія, лейкопения, нейтропенія чи тромбоцитопенія інших причин, не пов'язаних із ревматоїдним чи псоріатичним артритом. Інфекції тяжкого перебігу. Помірна чи тяжка ниркова недостатність (внаслідок незначного досвіду клінічних спостережень у цій групі хворих). Тяжка гіпопротеїнемія (у тому числі при нефротичному синдромі). **Подібні ефекти.** *Інфекції та інвазії:* рідко поширені — тяжкі інфекції, включаючи сепсис (у тому числі випадки з летальним кінцем). З боку *системи крові:* поширені — лейкопенія (лейкопенічні лейкози <2 г/л); непоширені — анемія, тромбоцитопенія; рідко поширені — панцитопенія, лейкопенія (лейкоцити <2 г/л), непоширені — тривожний стан. З боку *нервової системи:* поширені — парестезії, головний біль, запаморочення. З боку *серцево-судинної системи:* поширені — піомігія (піомігії), лінгвостегії, гіперплідемія, гіпофосфатемія; рідко поширені — зростання рівня лактатдегідрогенази. *Психічні порушення:* непоширені — тривожний стан. З боку *респіраторної системи:* поширені — парестезії, головний біль, запаморочення. З боку *інтерстиціальної пневмонії:* поширені — піомігії, діарея, нудота, блівлення, біль у животі, ураження слизової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки); рідко поширені — порушення смаку. З боку *гепатобіліарної системи:* поширені — зростання рівня печені, тривожний стан. З боку *урологічної системи:* поширені — аденома простати, гідроцістоз, гідроуретер, гідроуропіелоз. З боку *ревматоїдного тракту:* поширені — діарея, нудота, блівлення, біль у животі, ураження слизової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки); рідко поширені — порушення смаку. З боку *гепатобіліарної системи:* поширені — зростання рівня печені, тривожний стан. З боку *кістково-м'язової системи:* поширені — тендосиновіт; непоширені — розрив сухожиль. *Загальні порушення:* поширені — анорексія, втрата маси тіла (зазвичай незначна), астенія. **Назва і місцезнаходження виробника.** КУСУМ ХЕЛТХЕР ПВТ. ЛТД. СП 289 (А), РІКО Индл. Ареа, Чоранкі, Бхіваді (Радж.), Індія. **Категорія відпуску.** За рецептром.

Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.