



АЕРТАЛ®

ацеклофенак

Нове покоління золотого стандарту НПЗП



ПЕРЕНОСИМІСТЬ

Аертал® має високий рівень переносимості з боку ШКТ внаслідок мінімального пригнічення простагландинів слизової оболонки шлунка^{1,2}



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Аертал® високоефективний завдяки своєму багатофакторному механізму дії на цілий ряд медіаторів запалення.^{3,4}
Має хондропротекторну дію⁵



КОМФОРТНІСТЬ

Загальна кількість пацієнтів, які пройшли лікування, становила 96,6 мільйонів більше ніж за 15 років.
Понад 90% пацієнтів (93,5%) дали позитивну оцінку препарату⁶

¹Yanagawa A, et al. (1998) Endoscopic study of the damaging action of diclofenac Na, aceclofenac and its placebo on the gastric and duodenal mucosa. Jap J Rheumatol, 8:249-59. ²Huskisson E, et al. (2000) A large prospective open-label, multicentre SAMM study, comparing the safety of aceclofenac in patients with rheumatic disease. Eur J Rheumatol Inflamm., Vol.17-Issue 1:1-7. ³Diaz C, Rodriguez de la Serna A, Gell C, et al. (1996) Efficacy and tolerability of aceclofenac vs. diclofenac in the treatment of knee Osteoarthritis. A multicenter study. Eur J Rheumatol Inflamm; 16(1): 17-22. ⁴Kornasoff D, Maisenbacher J, Bowdler J, et al. (1996) The efficacy and tolerability of aceclofenac compared to indometacin in patients with Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Int; 15:225-30. ⁵Dingle J, et al., (1999) The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages. Z Rheumatol., 58 (3): 125-129; Blot L, et al., (2000) Effects of diclofenac, aceclofenac and meloxicam on the metabolism of proteoglycans and hyaluronan in osteoarthritic human cartilage. Br J Pharmacol., 131 (7): 1413-1421. ⁶Lemmel E.M., et al., (2002) Patient and physician satisfaction with aceclofenac: results of the European Observational Cohort Study (experience with aceclofenac for inflammatory pain in daily practice). Aceclofenac is the treatment of choice for patients and physicians in the management of inflammatory pain. Curr. Med. Res. Opin., 18 (3): 146-153.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату АЕРТАЛ® (AIRTAL®). Склад: діюча речовина: ацеклофенак; 1 таблетка містить 100 мг ацеклофенаку; допоміжні речовини: ядро таблетки: гліцерол дистеарат, натрію кроскармеллоза, повідон, целюлоза мікрокристалічна; оболонка: сепіфілм 752, білий (гіпромелоза, целюлоза мікрокристалічна, титановий діоксид (E171), макроголу стеарат). Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні оцтової кислоти та споріднені речовини. Код АТС M01A B16. Показання. Симптоматична терапія болювого синдрому та запалення при остеоартриті, ревматоїдному артриті та анкілозуючому спонділіті, а також при інших захворюваннях опорно-рухового апарату, що супроводжуються болем (наприклад плечополтвовий періартрит або позасуглобовий ревматизм). Як анальгетик при станках, що супроводжуються болем (включаючи біль у поперековому відділі, зубний біль і первинну (функціональну) дисменорею). Протипоказання: пацієнти з гіперчутливістю до ацеклофенаку, будь-якого допоміжного компонента препарату, ацетилсаліцилової кислоти або НПЗП. Побічні реакції. Часто (>1/100, <1/10): запаморочення; диспепсія, біль у животі, нудота, діарея; підвищення активності печінкових ферментів. Нечасто (>1/1000, <1/100): метеоризм, гастрит, запор, блювання, виразковий стоматит; свербіж, висип, екзантема, дерматит, кропив'янка; підвищення концентрації сечовини в крові, підвищення вмісту креатиніну в крові. Рідко (>1/10 000, <1/1000): анемія; анафілактичні реакції (включаючи шок), гіперчутливість; порушення зору; серцева недостатність; артеріальна гіпертензія; задихка; мелена (включаючи геморагічну діарею); набряк обличчя. Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C. Упаковка. 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блистері; 2 або 6 блистерів у картонній упаковці. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. БАТ «Гедон Ріхтер», Будапешт, Угорщина, за ліцензією Алпірал А. Г., Швейцарія. Р.п. № UA/5359/01/01; Наказ МОЗ України № 700 від 26.10.2011. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.



РІХТЕР ГЕДЕОН

Засновано у 1961 році

Представництво «Ріхтер Гедон» в Україні: 01054, Київ, вул. Тургенєвська, 17Б.

Тел.: +38 (044) 389-39-50 (-51), факс: (044) 389-39-52, e-mail: ukraine@richter.kiev.ua www.richter.com.ua