



ЛЕФНО®

Лефлуномід

таблетки 20 мг № 30

LEFNO®
Leflunomide

ПОВЕРНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ РУХІВ



■ Зберігає та достовірно покращує якість життя пацієнтів із ревматоїдним та псоріатичним артритом

■ Зменшує вираженість позасуглобових проявів і клінічних симптомів ревматоїдного та псоріатичного артури

■ Запобігає порушенню функції та достовірно сповільнює прогресування рентгенологічної деструкції суглобів

■ Однаково ефективний у пацієнтів із раннім (тривалість менше 2 років) та пізнім (більше 2 років) ревматоїдним артритом

Kusum

Виробник:
«Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД»
Тел.: (044) 495-82-88



Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

ЛЕФНО® Р. П. МОЗ України № UA/6367/01/02 від 28.04.2012 р. Склад: 1 таблетка містить лефлуноміду 20 мг. **Лікарська форма.** Таблетки. **Фармакотерапевтична група.** Імуносупресори. **Код АТС.** L04A A13. **Показання до застосування.** Активна фаза ревматоїдного артриту у дорослих пацієнтів; активна фаза псоріатичного артриту. Протипоказання. Підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі із синдромом Стівенса — Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліфібрином із еритемою) чи до інших компонентів препарату. Порушення функції печінки. Тяжкі імунодефіцитні стани (у тому числі СНІД). Виражені порушення кістково-мозкового кровотворення або виражена анемія, лейкопения, нейтропенія чи тромбоцитопенія внаслідок інших причин, не пов'язаних із ревматоїдним чи псоріатичним артритом. Інфекції тяжкого перебігу. Помірна чи тяжка ниркова недостатність (внаслідок незначного досвіду клінічних спостережень у цій групі хворих). Тяжка гіпотропеїнемія (у тому числі при нефротичному синдромі). **Побічні ефекти.** Інфекції та інвазії: рідко поширені — тяжкі інфекції, включаючи сепсис (у тому числі випадки з летальним кінцем). З боку системи крові: поширені — лейкопенія (лейкоцити <2 г/л); непоширені — анемія, тромбоцитопенія; рідко поширені — панцитопенія, лейкопенія (лейкоцити <2 г/л), еозинофілія. З боку імунної системи: поширені — алергічні реакції легкого ступеня. З боку обміну речовин: поширені — зростання рівня креатинінфосфокінази; непоширені — гіпокаліємія, гіперліпідемія, гіпофосфемія; рідко поширені — зростання рівня лактатдегідрогенази. **Психічні порушення:** непоширені — тривожний стан. З боку нервової системи: поширені — парестезії, головний біль, запамороччення. З боку серцево-судинної системи: поширені — помірне підвищення артеріального тиску; рідко поширені — значне підвищення артеріального тиску. З боку дихальної системи: рідко поширені — інтерстиціальна пневмонія (у тому числі випадки з летальним кінцем). З боку травного тракту: поширені — діарея, нудота, бл�вання, біль у животі, ураження слизової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки); рідко поширені — порушення смаку. З боку гепатобіліарної системи: поширені — зростання рівня печінкових трансаміназ (особливо аланінаміотрансферази), рідше — зростання рівня гамма-глутатіон-трансферази і лужної фосфатази, гіпербліруїнемія; рідко поширені — гепатит, жовтяниця, холестаз. З боку шкіри та придатків: поширені — підвищене випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (у тому числі макулопапульозні), свербіж, сухість шкіри; рідко поширені — крапив'янка. З боку кістково-м'язової системи: поширені — тендосиновіт; непоширені — розрив сухожиль. Загальні порушення: поширені — анорексія, втрата маси тіла (зазвичай незначна), астенія. **Назва і місцезнаходження виробника.** КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД. СП 289 (А), РІІКО Інді. Ареа, Чопанкі, Бхіваді (Радж.), Індія. **Категорія відпуску.** За рецептром.

Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.