

# Сучасні можливості лікування болю



**TEVA**

## Олфен™ Диклофенак натрію

Лікарські форми  
препаратів Олфен™

### Інформація про лікарські засоби Олфен™

**Олфен™-75** · Склад: діюча речовина: 2 мл розчину (1 ампула) містить диклофенак натрію 75 мг і підікотін гідрохлориду 20 мг. **Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій. **Показання.** Препаратор призначають у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій при наступних станах: загострення запальних або дегенеративних форм ревматизму (ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартрит, спондилоартрит, вертебральні більові синдроми, позасуглобовий ревматизм); гострий напад подагри; ниркова та печінкова коліка; біль, запалення та набряки після травм і хірургічних втручань. **Побічні реакції.** Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспесія, метеоризм, анорексія та ін.

**Олфен™-100 Ректокапс** · Склад: діюча речовина: диклофенак натрію, 1 капсула ректальна містить диклофенак натрію 100 мг. **Лікарська форма.** Капсули ректальні. **Показання.** Запальні та дегенеративні форми ревматизму (хронічний поліартріт, ювенільний ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартріт, у т. ч. спондилоартроз, більовий цервікальний синдром); ревматичні захворювання позасуглобових тканін; посттравматичні та післяопераційні більові синдроми, що супроводжуються запаленням і набряком (після стоматологічних та ортопедичних операцій), біль та/або запалення при гінекологічних захворюваннях (первинна дисменорея, аднексит); гострі напади подагри; як допоміжне лікування при гострих запальних інфекційних захворюваннях вуха, носа, горла, що супроводжуються більовим синдромом (фарингіт, тонзиліт, отит). **Побічні реакції.** Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспесія, метеоризм, анорексія та ін.

**Олфен™-100 CR Депокапс** · Склад: діюча речовина: диклофенак натрію; 1 капсула пролонгованої дії містить диклофенак натрію 100 мг. **Лікарська форма.** Капсули пролонгованої дії. **Показання.** Запальні та дегенеративні форми ревматизму (хронічний поліартріт, ювенільний ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартріт, у т. ч. спондилоартроз, більовий цервікальний синдром); ревматичні захворювання позасуглобових тканін; посттравматичні та післяопераційні більові синдроми, що супроводжуються запаленням і набряком (після стоматологічних та ортопедичних операцій); біль та/або запалення при гінекологічних захворюваннях (первинна дисменорея, аднексит). **Побічні реакції.** Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспесія, метеоризм, анорексія та ін.

**Олфен™-50 Лактаб** · Склад: діюча речовина: диклофенак натрію; 1 таблетка кишково-розчинна містить диклофенак натрію 50 мг. **Лікарська форма.** Таблетки кишково-розчинні. **Показання.** Запальні та дегенеративні форми ревматизму (хронічний поліартріт, ювенільний ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартріт, у т. ч. спондилоартроз, більовий цервікальний синдром); ревматичні захворювання позасуглобових тканін; посттравматичні та післяопераційні більові синдроми, що супроводжуються запаленням і набряком (після стоматологічних та ортопедичних операцій), біль та/або запалення при гінекологічних захворюваннях (первинна дисменорея, аднексит); гострі напади подагри; як допоміжне лікування при гострих запальних інфекційних захворюваннях вуха, носа, горла, що супроводжуються більовим синдромом (фарингіт, тонзиліт, отит). **Побічні реакції.** Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспесія, метеоризм, анорексія та ін.

**Олфен™ Гель** · Склад: діюча речовина: диклофенак натрію; 1 г гелю містить диклофенак натрію 10 мг. **Лікарська форма.** Гель. **Показання.** Симптоматичне лікування болю, запалення та набряків, пошкодження м'яких тканін, травми сухожилі, зв'язок, м'язів і суглобів (внаслідок вивику, розтягання, синіць); спортивні травми; локалізовані форми ревматизму м'яких тканін: тендініт (у т. ч. «лікоть тенісиста»), бурсит, плечовий синдром і періартропатія, локалізовані форми дегенеративного ревматизму (остеоартріт периферичних суглобів і хребта).

**Олфен™ трансдермальний пластырь** · Склад: діюча речовина: 1 пластір містить диклофенак натрію 140 мг/12 год на 140 см<sup>2</sup>. **Лікарська форма.** Пластыр трансдермальний. **Показання.** Місцеве лікування запалення сухожилі, зв'язок, м'язів і суглобів травматичної етіології (розтягнення зв'язок і сухожилі, вивихи, забої); локалізовані форми ревматизму м'яких тканін і суглобів. **Побічні реакції.** Висипання, свербіж та ін.

**Виробники.** Меркль ГМБХ, Німеччина; Аціно Фарма АГ, Швейцарія; Р.П. Шерер ГмбХ, Німеччина; Мєфа ЛЛС, Швейцарія.

Р.П. МОЗ України: № UA/5122/01/01, № UA/5124/01/01, № UA/5125/01/01, № UA/5123/01/01 від 18.08.2011, № UA/0646/02/01 від 11.11.2011, № UA/5930/01/01 від 15.12.2011.

**Інформація про лікарські засоби. Характеристики та лікувальні властивості лікарських засобів.** Повна інформація про застосування лікарських засобів і повний перелік побічних реакцій міститься в інструкціях для медичного застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ і лікарів. Затверджено до друку: червень, 2014 · ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: бульвар Дружби Народів, 19, 5-й поверх, м. Київ, 01042. Тел. + 38 044 594 70 80 · www.teva.ua