



ПИАСКЛЕДИН 300

комплекс неомыляемых фитостеролов и жирных кислот (ASU)

Европейский подход к лечению остеоартроза¹



Легко принимать

- 1 капсула в сутки — утром во время еды
- Курс приема — 3–6 мес



Замедляет прогрессирование остеоартроза^{2,3}



Уменьшает боль в суставах и позвоночнике^{4,5}



Снижает прием НПВП⁶



Обладает хорошей переносимостью^{7,8}

1. Maheu E., Mazieres B., Valat J.-P., et al. Symptomatic efficacy of avocado/soybean unsaponifiables in the treatment of osteoarthritis of the knee and hip. *Arthritis Rheum* 1998; 41: 81-91. 2. Boumedine K., Felisaz N., Bogdanowicz P., Galera P., Guillou G., Pujol J.P., et al. Avocado/soya unsaponifiables enhance the expression of transforming growth factor pi and P2 in cultured articular chondrocytes, *Arthritis Rheum* 1999; 42: 148-56. 3. Lequesne M., Maheu E., Cadet C., et al. Structural effect of avocado/soybean unsaponifiables on joint space loss in osteoarthritis of hip. *Arthritis Care Research* 2002; 47: 50-58. 4. Shostak N.A., Pravdyuk N.G., Degenerative spine: presentation of a disease, therapy approach (own data) // *Modern rheumatology*. 2008. Number 3. P. 30-35. 5. Blotman F., Maheu E., Wulwic A., et al. Efficacy and safety of avocado/soybean unsaponifiables in the treatment osteoarthritis of the knee and hip. *Rev. Rhum. (Engl. Ed.)* 1997; 64: 825-34. 6. Christenen R., Barteles E.M., Astrup A., et al. Symptomatic efficacy of avocado/soybean unsaponifiables (ASU) in Osteoarthritis (OA) patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Osteoarthritis Cartilage* 2008; 16(2): 339-408. 7. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT) in *Ann Rheum Dis* 2003, 62: 1145-1155. doi: 10.1136/ard.2003.011742 8. OARSJ recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009. *2010 Apr*; 18(4): 476-99. doi: 10.1016/j.joca.2010.01.013. Epub 2010 Feb 11.

Краткая характеристика препарата

Состав лекарственного средства. Масла авокадо неомыляемые соединения — 100 мг; масла сои неомыляемые соединения — 200 мг. **Форма выпуска.** Капсулы. **Фармакотерапевтическая группа.** Другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Код АТС. M01AX26. **Показания к применению.** В ревматологии симптоматическое лечение остеоартроза коленных и тазобедренных суставов. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. **Применение в период беременности или кормления грудью.** Не рекомендуется. **Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами.** Не имеет известного влияния на способность управлять транспортом или работать с другими механизмами. **Дети.** Препарат не стоит применять у детей в возрасте до 18 лет. **Способ применения и дозы.** Применяют у взрослых внутрь 1 капсулу 1 раз в сутки. Капсулу не разжевывать. Длительность курса лечения определяет врач. **Передозировка.** Не описано. **Побочные эффекты.** Со стороны пищеварительной системы: очень редко — отрыжка с жироподобным вкусом, диарея, боль в эпигастрии. Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — повышение трансаминаз, щелочной фосфатазы, билирубина. Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Отсутствует информация относительно взаимодействия Пиаскледина 300 с другими лекарственными средствами. **Упаковка.** По 15 капсул в ПВХ/алюминиевом блистере; по 1 блистеру в коробке. **Отпускается без рецепта.** Более детальную информацию смотрите в инструкции по медицинскому применению.

Информация о лекарственном средстве. Информация для специалистов здравоохранения для использования в профессиональной деятельности.