


Сучасні можливості лікування болю



ТЕВА

Олфен™ Диклофенак натрію

Лікарські форми препаратів Олфен™

Олфен™-75 · *Склад:* діюча речовина: 2 мл розчину (1 ампула) містять диклофенаку натрію 75 мг і лідокаїну гідрохлориду 20 мг. *Лікарська форма.* Розчин для ін'єкцій. *Показання.* Препарат призначають у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій при наступних станах: загострення запальних або дегенеративних форм ревматизму (ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартрит, спондилоартрит, вертебральні больові синдроми, позасуглобовий ревматизм); гострий напад подагри; ниркова та печінкова колька; біль, запалення та набряки після травм і хірургічних втручань. *Побічні реакції.* Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм, анорексія та ін.

Олфен™-100 Ректокапс · *Склад:* діюча речовина: диклофенак натрію, 1 капсула ректальна містить диклофенаку натрію 100 мг. *Лікарська форма.* Капсули ректальні. *Показання.* Запальні та дегенеративні форми ревматизму (хронічний поліартрит, ювенільний ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартрит, у т. ч. спондилоартроз, больовий цервікальний синдром); ревматичні захворювання позасуглобових тканин; посттравматичні та післяопераційні больові синдроми, що супроводжуються запаленням і набряком (після стоматологічних та ортопедичних операцій); біль та/або запалення при гінекологічних захворюваннях (первинна дисменорея, аднексит); напади мігрені; гострі напади подагри; як допоміжне лікування при гострих запальних інфекційних захворюваннях вуха, носа та горла, що супроводжуються больовим синдромом (фарингіт, тонзиліт, отит). *Побічні реакції.* Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм, анорексія та ін.

Олфен™-100 СР Депокапс · *Склад:* діюча речовина: диклофенак натрію; 1 капсула пролонгованої дії містить диклофенаку натрію 100 мг. *Лікарська форма.* Капсули пролонгованої дії. *Показання.* Запальні та дегенеративні форми ревматизму (хронічний поліартрит, ювенільний ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартрит, у т. ч. спондилоартроз, больовий цервікальний синдром); ревматичні захворювання позасуглобових тканин; посттравматичні та післяопераційні больові синдроми, що супроводжуються запаленням і набряком (після стоматологічних та ортопедичних операцій); біль та/або запалення при гінекологічних захворюваннях (первинна дисменорея, аднексит). *Побічні реакції.* Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм, анорексія та ін.

Олфен™-50 Лактаб · *Склад:* діюча речовина: диклофенак натрію; 1 таблетка кишковорозчинна містить диклофенаку натрію 50 мг. *Лікарська форма.* Таблетки кишковорозчинні. *Показання.* Запальні та дегенеративні форми ревматизму (хронічний поліартрит, ювенільний ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, остеоартрит, у т. ч. спондилоартроз, больовий цервікальний синдром); ревматичні захворювання позасуглобових тканин; посттравматичні та післяопераційні больові синдроми, що супроводжуються запаленням і набряком (після стоматологічних та ортопедичних операцій); біль та/або запалення при гінекологічних захворюваннях (первинна дисменорея, аднексит); гострі напади подагри; як допоміжне лікування при гострих запальних інфекційних захворюваннях вуха, носа, горла, що супроводжуються больовим синдромом (фарингіт, тонзиліт, отит). *Побічні реакції.* Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм, анорексія та ін.

Олфен™ Гель · *Склад:* діюча речовина: диклофенак натрію; 1 г гелю містить диклофенаку натрію 10 мг. *Лікарська форма.* Гель. *Показання.* Симптоматичне лікування болю, запалення та набряків, пошкодження м'яких тканин, травми сухожиль, зв'язок, м'язів і суглобів (внаслідок вивиху, розтягнення, синців); спортивні травми; локалізовані форми ревматизму м'яких тканин: тендиніт (у т. ч. «лікоть тенісиста»), бурсит, плечовий синдром і періартропатія, локалізовані форми дегенеративного ревматизму (остеоартрит периферичних суглобів і хребта). *Побічні реакції.* Легкі тимчасові реакції на шкірі в місці нанесення, алергічні реакції, пустульозні висипання, реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк та ін.

Олфен™ трансдермальний пластр · *Склад:* діюча речовина: 1 пластр містить диклофенаку натрію 140 мг/12 год на 140 см². *Лікарська форма.* Пластр трансдермальний. *Показання.* Місцеве лікування запалень сухожиль, зв'язок, м'язів і суглобів травматичної етіології (розтягнення зв'язок і сухожиль, вивихи, забиття); локалізовані форми ревматизму м'яких тканин і суглобів. *Побічні реакції.* Висипання, свербіж та ін.

Виробники. Меркле ГмБХ, Німеччина; Ацино Фарма АГ, Швейцарія; Р.П. Шерер ГмБХ, Німеччина; Мефа ЛЛС, Швейцарія.

Р.П. МОЗ України: № UA/5122/01/01, UA/5124/01/01, UA/5125/01/01, UA/5123/01/01 від 18.08.2011, UA/0646/02/01 від 11.11.2011, UA/5930/01/01 від 15.12.2011.

Інформація про лікарські засоби. Характеристики та лікувальні властивості лікарських засобів. Повна інформація про застосування лікарських засобів і повний перелік побічних реакцій містяться в інструкціях для медичного застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Інформація призначена для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників, для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики або для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ і лікарів. Затверджено до друку: лютий, 2015 - ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: бульвар Дружби Народів, 19, 5-й поверх, м. Київ, 01042. Тел. +38 044 594 70 80 - www.teva.ua