


# Лікування БОЛЮ без БОЛЮ\*



Візуальна аналогова шкала (ВАШ) для оцінювання інтенсивності болю, бали<sup>1</sup>

Біль нестерпний	Біль сильний	Біль помірний	Біль помірний	Біль легкий	Біль відсутній
10 балів	8 балів	6 балів	4 бали	2 бали	0 балів
Біль вимагає постільного режиму	Біль заважає основним потребам	Біль заважає концентруватися	Біль заважає діяльності	Біль можна ігнорувати	Біль відсутній

TEVA

Олфен™ -75  
Диклофенак натрію



\* Інструкція для медичного застосування препарату Олфен™-75, розчин для ін'єкцій. 1. Бивольцев В.А., Белых Е.Г., Александрова Н.В., Сороковиков В.А. Применение шкал и анкет в обследовании пациентов с дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника: методические рекомендации / Иркутск: ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН, 2013. – 32 с.

**Олфен™-75, розчин для ін'єкцій.** *Склад:* 2 мл розчину (1 ампула) містить диклофенаку натрію 75 мг і лідокаїну гідрохлориду 20 мг. *Лікарська форма.* Розчин для ін'єкцій. *Фармакоперевітнична група.* Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Код АТС М01А В55. *Показання.* Призначають у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій при таких станах: загострення запальних чи дегенеративних форм ревматизму; гострі напади подагри; ниркова та печінкова колька; біль, запалення та набряк після травм та хірургічних втручань. *Протипоказання.* Відома гіперчутливість до діючих речовин або до будь-яких інших компонентів препарату; кровотеча або перфорація в ділянці ШКТ; активна або рецидивна форма виразкової хвороби; запальні захворювання кишечника; печінкова недостатність; ниркова недостатність; застійна серцева недостатність (NYHA II-IV); ІХС у пацієнтів, які мають стенокардію, перенесений інфаркт міокарда; захворювання периферичних артерій; при аортокоронарному шунтуванні (або при використанні апарату штучного кровообігу); атріовентрикулярна блокада II і III ступеня, високий ризик післяопераційної кровотечі, порушень згортання крові; міастенія; порфірія. *Побічні реакції.* Абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, абдомінальні спазми, диспепсія, метеоризм, анорексія та ін. *Категорія відпуску.* За рецептом. *Виробник:* Меркле ГмБХ, Німеччина. Р.Л. МОЗ України: № UA/5122/01/01 від 18.08.2011.

**Інформація про лікарський засіб.** Характеристики та лікувальні властивості лікарського засобу. Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій містяться в інструкції для медичного застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Інформація призначена для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. • ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: бульвар Дружби народів, 19, 5-й поверх, м. Київ, 01042. Тел. +38 (044) 594-70-80 • www.teva.ua