

Флекцерин

діацереїн 50 мг

— *правильний вибір*
в лікуванні остеоартрозу!

● Діацереїн є найбільш правильним вибором при лікуванні пацієнтів із поєднанням коксартрозу з гонартрозом¹

● Має оригінальний комплексний (знеболювальний та хондропротекторний) механізм дії*

● Рекомендований Європейською антиревматичною лігою¹

● Не інгібує синтезу простагландинів (не має гастродуоденальних побічних ефектів)²

Від
вітчизняного
виробника



*Інгібує синтез та активність інтерлейкіну (IL)-1, що відіграє провідну роль у патогенезі остеоартриту; підвищує продукування трансформуючого фактора росту (TGF)- β , який ініціює проліферацію хондроцитів і стимулює продукування колагену II, протеогліканів і гіалурону².

Література:
1. Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Крилова А.С., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Вибір структурно-модифікуючих і противовпалительних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом. Український ревматологічний журнал, №2 (52), 2013.
2. Інструкція для медичного застосування препарату Флекцерин.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату Флекцерин

Склад: 1 капсула містить діацереїну 50 мг. **Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Код АТС M01A X21.

Показання. Ревматичні захворювання суглобів (остеоартрит, остеоартроз). **Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату або до антрахіну в анамнезі. **Спосіб застосування та дози.** Протягом перших 2–4 тижнів лікування Флекцерин призначають дорослим по 1 капсулі (50 мг) після прийому їжі на ніч. Починаючи з 2–4-го тижня лікування, дозу препарату підвищують до 100 мг на добу за 2 прийоми (по 1 капсулі вранці та ввечері після їди). Препарат застосовують протягом тривалого періоду (не менше 6 міс). **Тривалість курсу лікування** встановлює лікар індивідуально. **Пацієнти з хронічною нирковою недостатністю.** При нирковій недостатності може змінюватися фармакокінетика діацереїну. У цих випадках рекомендується знизити дозу до 1 капсули на добу (кліренс креатиніну <30 мг/мл). **Побічні реакції.** Можливі диспептичні явища, діарея, біль у животі, які виникають протягом першого місяця лікування. Інші побічні ефекти включають підвищення рівня печінкових ферментів, інтенсивне забарвлення сечі в жовтий колір, алергічні шкірні реакції (кропив'янка, свербіж). **Передозування.** При випадковому або навмисному прийомі діацереїну у великих дозах може виникнути діарея. Специфічного антидоту не існує. **Невідкладне лікування** полягає у відновленні електролітного балансу. **Застосування у період вагітності або годування грудьми.** Протипоказано. **Діти.** Ефективність і безпека застосування препарату в дітей не встановлені, тому діацереїн протипоказано застосовувати у цій віковій групі. **Особливості застосування.** З огляду на пізній початок дії (через 2–4 тиж) протягом першого місяця лікування Флекцерином його можна поєднувати з іншими нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) та анальгетиками. Під час терапії діацереїном слід періодично (1 раз на 2–3 міс) робити розгорнутий аналіз крові, визначення ферментів печінки та аналіз сечі. Слід тимчасово припинити лікування у разі терапії антибіотиками, оскільки останні можуть вплинути на кишкову флору та кінетику препарату. Лікування діацереїном може посилити симптоми ентероколіту у хворих, які приймають антибіотики та хіміотерапію, що впливають на кишкову флору. З обережністю призначати пацієнтам із хронічною нирковою недостатністю. У ході досліджень не відбувалося фармакокінетичних змін діацереїну при помірному і тяжкому цирозі печінки. При застосуванні діацереїну з їжею зростає всмоктування препарату (на 24%); з іншого боку, тривалий дефіцит їжі знижує біодоступність діацереїну. Як частота виникнення побічних ефектів, так і прискорений транзит через кишечник прямо пропорційно залежать від кількості діацереїну, що всмоктався. Прийом препарату натщесерце або після дуже невеликої кількості їжі може призвести до розвитку побічної дії. Препарат містить лактозу, тому його не слід застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази Лаппа або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози. **Фармакодинаміка.** Флекцерин — це лікарський засіб для лікування остеоартриту та остеоартрозу, який має анальгетичні, антипиретичні та протизапальні властивості. Діацереїн класифікується як повільнодіючий засіб, ефект якого з'являється протягом 2–4 тижнів лікування і досягає клінічної значущості після 4–6 тиж. Він має оригінальний механізм дії, що відрізняється від механізму дії НПЗП. Діацереїн, як і його активний метаболіт реїн, інгібує синтез гастродуоденальних побічних ефектів. **Упаковка.** По 10 капсул у блистері; по 1 або 3 блистери у паці. **Категорія відпуску.** За рецептом. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату Флекцерин.

Інформація призначена для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних закладів та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях та симпозіумах на медичну тематику.



КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД
Якісно без компромісів!

Регістраційне посвідчення МОЗ України № UA/12618/01/01 від 30.11.12