


# КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ

Високі дози трьох вітамінів!<sup>1,2</sup>

Вітаміни B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, що відіграють важливу роль у роботі нервової системи<sup>1,2</sup>



Нейрорубін™  
Вітаміни B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>

TEVA

1. Інструкція для медичного застосування препарату Нейрорубін™, розчин для ін'єкцій. 2. Інструкція для медичного застосування препарату Нейрорубін™-Форте Лактаб, таблетки.

**Нейрорубін™, розчин для ін'єкцій** - Склад: діючі речовини: тіаміну гідрохлорид (вітамін B<sub>1</sub>), піридоксину гідрохлорид (вітамін B<sub>6</sub>), ціанкобаламін (вітамін B<sub>12</sub>); 1 ампула (3 мл) з розчином містить: тіаміну гідрохлориду (вітамін B<sub>1</sub>) 100 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін B<sub>6</sub>) 100 мг, ціанкобаламіну (вітамін B<sub>12</sub>) 1 мг, допоміжні речовини. **Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій. **Фармакотерапевтична група.** Вітаміни B<sub>1</sub> у комбінації з вітаміном B<sub>6</sub> та/або B<sub>12</sub>. Код АТХ A11D B. **Показання.** Лікування невритів і невралгій, таких як: невралгія триїчного нерва; міжреберна невралгія; ішіас; поперековий синдром (люмбаго); плексит (шийного та плечового сплетіння); корицеві неврити наслідок дегенеративних захворювань хребта; прозоплегія (бузження лицьового нерва). **Протипоказання.** Печерчугливість до будь-якого компонента препарату; алергічні захворювання; виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки у стадії загострення; еритроцитоз, тромбоемболія. **Побічні реакції.** Реакції гіперчутливості; інгібіція виділення пролактину; відчуття неспокою; до довготривалого застосування може призвести до периферичної сенсорної невралгії, нервового збудження, нездування, головного болю, запаморочення; тахікардія, циркуляторний колапс; ціаноз, набряк легень; шлунково-кишкової розлади, у т. ч. блювання, діарея, біль у животі, підвищення кислотності шлункового соку, нудота, кровотеча з органів травного тракту; високі дози препарату можуть призвести до підвищення рівня глутамінової аспартат-амінотрансферази (АСТ) у сироватці крові; свербіж, кропив'янка; реакції у місці введення, підвищена пітливість, слабкість, та ін. **Увага зберігання.** Зберігати при температурі 2-8°C (у холодильнику). Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 3 роки. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** Меркле ГмБХ, Німеччина. Р.Л. МОЗ України №ЦА/10051/01/01 від 18.09.2014.

**Нейрорубін™-Форте Лактаб, таблетки.** Склад: діючі речовини: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить тіаміну нітрату (вітамін B<sub>1</sub>) 200 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін B<sub>6</sub>) 50 мг, ціанкобаламіну (вітамін B<sub>12</sub>) 1 мг, допоміжні речовини. **Лікарська форма.** Таблетки, вкрите плівковою оболонкою. **Фармакотерапевтична група.** Препарати вітаміну B<sub>1</sub> у комбінації з вітаміном B<sub>6</sub> та/або B<sub>12</sub>. Код АТХ A11D B. **Показання до застосування.** Супутня терапія при невротичних болях; невралгія; невротичні болі при гострих або хронічних невритах та поліневритах; токсичні ураження нервової тканини при алкоголізмі, діабетичній полінейропатії, інтоксикації лікарськими препаратами. **Протипоказання.** Відома гіперчутливість до вітамінів B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> і B<sub>12</sub>. Вітамін B<sub>1</sub> протипоказано застосовувати при алергічних захворюваннях. Вітамін B<sub>6</sub> протипоказано застосовувати при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки у стадії загострення. Вітамін B<sub>12</sub> протипоказаний при еритремії, еритроцитозі, тромбоемболії, псоріазі, тому що у хворих на псоріаз може розвиватися так звана «реакція спалаху» на вітамін B<sub>12</sub>, котра проявляється погіршенням симптомів хвороби. **Побічні реакції.** З боку імунної системи: реакції гіперчутливості. Алергічні реакції зустрічаються досить рідко. З боку нервової системи: відчуття неспокою, нервово збудження, головний біль. З боку серцево-судинної системи: тахікардія. З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, діарея, біль у животі, підвищення кислотності шлункового соку. З боку шкіри та підшкірної клітковини: шкірні висипання, відчуття свербіж, кропив'янка. Інші розлади: пітливість, відчуття слабкості, запаморочення, нездування та ін. **Увага.** По 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блистері, по 2 блистери в картонній коробці. **Категорія відпуску.** Без рецепта. **Виробник.** Аціно Фарма АГ, Швейцарія. Р.Л. МОЗ України №ЦА/1950/02/01 від 19.07.2012.

**Інформація про лікарські засоби.** Характеристики, лікувальні властивості лікарських засобів, повна інформація про застосування препаратів та повний перелік побічних реакцій містяться в інструкціях для медичного застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Відпускається в аптеках та їх структурних підрозділах за рецептом. Інформація призначена для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. **ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»:** бульвар Дружби Народів, 19, 5-й поверх, м. Київ, 01042. Тел. +38 (044) 594-70-80 • www.teva.ua

NRUU-UA-00004 • Термін придатності промакетеріалу – жовтень, 2017 р.