

ЕНБРЕЛ працює інакше: це сприяє довготривалим перевагам в ефективності при лікуванні Ваших пацієнтів



ЕНБРЕЛ – розчинний рецептор ФНП –
імітує дію природніх рецепторів ФНП^{1,2}

Немає потреби нарощувати дозу
або збільшувати частоту прийому
препаратору^{1,2}

- Розчинний рецептор ФНП
- Зручний спосіб введення

Література: 1. Інструкція до медичного застосування Енбрел.
Реєстраційне посвідчення UA/13011/01/01 від 03.07.2013
2. Scallan R, Cai A, Solowski N, et al. Binding and functional
comparisons of two types of tumor necrosis factor antagonists.
J Pharmacol Exper Ther. 2002; 301: 418-426



За додатковою інформацією звертатися
у Представництво «Файзер Ейч.
Сі. Пі. Корпорейшн» в Україні, 03608,
м. Київ, вул. Амосова 12. Тел. (044) 291-60-50



Енбрел (станкерцепт), рекомбінантний химерний білок p75г с 25 або 50 мг етанерцепт у розчині для ін'єкції у попередньо наповненому шприці/ручи в комплекти з розчинником, та стериліним контейнером для ін'єкції №4 у пластиковому контейнері. Коротка інструкція для медичного застосування. Енбрел є комбінацією засобів застосуванням, дозуванням, дріжджевого підсилювального агента, підтримки до післяового спутника у пероральній формі, інтерактивної інформації, які вироблені на базі відповідності дози/дії, антибіотиків і відсутності побічних ефектів. Состав: Енбрел, підтримка до післяового спутника, відповідність дози/дії, антибіотик, інтерактивна інформація, побічні ефекти. Енбрел показаний для лікування також активного і прогресуючого ремікаптного артриту у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували терапії метотрексатом, ювілінікою (ілоноптічний артрит). Лікування півтартигу та поширеного олігартріту у дітей віком від 2 років у разі недостатньої ефективності або непереносимості метотрексату. Лікування півтартигу у дітей віком від 12 років у разі відомої толерантності або недостатньої відповіді на терапію базовими протизаразними препаратами. Аксіалного спонділоартропату. Лікування дорослих з таким аксіалним анхіпізівінним спонділітозом у разі недостатньої ефективності традиційної терапії. Лікування дорослих пацієнтів з тяжким стадією аксіального спонділоартріту без рентгенологічного пітвідрядження з об'єктивними симптомами запалення, на цю вказує підвищений рівень С-реактивного білка та/або результати МРТ, які мають недостатньо відповідь на лікування нестероїдними протизаразними лікарськими засобами (НППЗ). Блішковий псоріаз. Лікування дорослих пацієнтів з блішковим псоріазом помірного або підвищеної ступеня та протипоказаними до застосування іншими методами системної терапії або фототерапії не буде досить достатньою державного контролю над захворюванням або спостерігається недостатність такого лікування. Спосіб застосування та дози. Лікування препаратором Енбрел має застосування та контролюється лікарем, який має досвід у діяності та лікуванні ревматоїдного артриту, ювілінікою (ілоноптічного артриту), спонділітозу, аксіального спонділоартріту з рентгенологічним пітвідрядженням, блішкоподібного псоріазу у дітей. Препаратор вводять підшкірно, перед застосуванням слід нагріти до кімнатної температури (залишити при кімнатній температурі на 10-15 хв.). Рекомендована доза – 25 мг два рази на тиждень або 50 мг один раз на тиждень. При блішковому псоріазі аналогично, але алтернативно можна застосовувати 50 мг два рази на тиждень не більше 12 тижнів. При півтартигу ювілінікою ідопатічним артриту у віці від 2 років доза становить 0,4 мг/кг маси тіла (максимальна разом доза 50 мг) два рази на тиждень. При блішковому псоріазі у дітей від 6 років доза становить 0,8 мг/кг (максимальна разом доза 50 мг) один раз на тиждень не більше 24 тижнів. Дозу препаратора Енбрел для дітей розраховують з урахуванням маси тіла дитини. Протипоказані: Підвищена чутливість до компонентів речовини. Сепсис або ризиг виникнення сепсису, включаючи хронічні або локалізовані інфекції. Побічні дії. Найчастіше повідомляються про розвиток таких побічних реакцій: реакції у місці введення, інфекції, алергічні реакції, утворення антітів, свірбік та лихоманка. Також повідомляються про виникнення тяжких побічних реакцій: різноманітних злюжісних пухлин, тяжких інфекцій, гематологічних, неврологічних та аутоімунних реакцій. Повідомляються про витядки центральної та периферичної демієнізації (рідко та дуже рідко, відповідно). Існує повідомлення про розвиток вовчиця, патологічних стін, пов'язаних із вовчиця, всасуванням. Особливості застосування: з обережністю у пацієнтів з рецидивуючими або хронічними інфекціями, при гепатиті В і С, злюжісних новоутвореннях та гематологічних порушеннях в аланізі, не можна починати лікування при активному туберкульозі, не можна застосовувати живі вакцини одночасно з лікуванням. Для більш детальної інформації дивися повну інструкцію. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: сумисне застосування з ананікро, абетепентом та сульфасалазином не рекомендується. Не слід змішувати Енбрел з іншими лікарськими засобами. Фармакологічні властивості. Етанерцепт – химерний блок рецептора фактора некрозу пухлин лідини та p75Fc, отриманий за допомогою технології рекомбінантної ДНК методом генної інженерії. Категорія відповідності: за рецептором. Реєстраційне свідоцтво № UA/13011/01/01 від 03.07.2013, 15.07.2015. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначена для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах на медичну тематику. Перед застосуванням препаратора необхідно ознайомитися з повною інструкцією.