

# ДІКЛОТОЛ®

Ацеклофенак

## На сходинку вище!



 **Виробник:**  
Кусум Хелтхекер ПБТ. ЛТД  
тел.: 0(44) 495 82 88  
[www.kusumhealthcare.com](http://www.kusumhealthcare.com)

 **Офіційний дистриб'ютор:**  
ТОВ «Гледфарм ЛТД»  
тел.: 0(44) 495-82-88  
[www.gladpharm.com](http://www.gladpharm.com)

**Покращений профіль безпеки<sup>1</sup>**  
**Висока ефективність терапії<sup>2</sup>**  
**Позитивний вплив на метаболізм хрящової тканини<sup>3</sup>**

1. Haskinsson E.C., Irani M., Murray F. A large prospective open-label, multi-centre SAMM study, comparing the safety of aceclofenac with diclofenac in patients with rheumatic disease // Eur. J. Rheumatol. Inflamm. – 2000. – Vol. 17. – P. 1–7.

2. Dooley M., Spencer C.M., Dunn C.J. et al. Aceclofenac. A reappraisal of its use in the management of pain and rheumatic disease // Drugs. – 2001. – Vol. 61, N 9. – P. 1351–1378. ); Pasero G., Marcolongo R., Serni U. et al. A multi-centre, double-blind comparative study of the efficacy and safety of aceclofenac and diclofenac in the treatment of rheumatoid arthritis // Rev. Esp. Reumatol. – 1992. – Vol. 19. – P. 263–268.

3. Henrotin Y., De Leval X., Mathy-Hartet M. et al. In vitro effects of aceclofenac and its metabolites on the production by chondrocytes of inflammatory mediators // Inflamm. Res. – 2001. – Vol. 50. – P. 391–399.

**Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.**

**ДІКЛОТОЛ®** Р.П. МОЗ України № UA/12364/01/01 від 19.07.2012 р. **Склад.** 1 таблетка містить 100 мг ацеклофенаку. **Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні оцтової кислоти та споріднені речовини. **Код АТС.** M01A B16. **Показання до застосування.** Симптоматична терапія у разі больового синдрому та запалення при остеоартриті, ревматоїдному артриті та анкілозивному спондиліті, а також інших захворювань опорно-рухового апарату, що супроводжуються болем (наприклад, плечолопатковий періартрит або позасуглобовий ревматизм). Як анальгетик при станах, що супроводжуються болем (включаючи біль у поперековому відділі, зубний біль і первинну (функціональну) дисменорею). **Протипоказання.** Гіперчутливість до ацеклофенаку або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату. Наявність в анамнезі свідчень, що прийом ацетилсаліцилової кислоти або інших нестероїдних протизапальних засобів спричиняв напади астми, бронхоспазм, напади гострого риніту або алергічні висипання; підвищена чутливість до подібних лікарських препаратів. Наявна у фазі загострення чи в анамнезі виразка шлунка або дванадцятипалої кишки чи підозра на неї, кровотеча у шлунково-кишковому тракті або інші наявні кровотечі чи порушення згортання крові. Тяжка серцева недостатність або тяжкі порушення функції нирок і печінки. **Побічні ефекти.** Найбільш частими побічними реакціями під час клінічних досліджень були реакції з боку шлунково-кишкового тракту (диспепсія – 7,5%, біль у животі – 6,2%, нудота – 1,5% і діарея – 1,5%), в окремих випадках виникало запаморочення. Також відзначалися скарги на реакції з боку шкірних покривів, включаючи свербіж і висипання, а також відхилення від норми у показниках печінкових ферментів. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.**