

ФОРСАНЕК®

форсуй лікування болю та запалення



- ◆ Швидка та тривала сила дії^{1, 2**}
- ◆ Зручне застосування – один раз на добу¹
- ◆ Безпечніший за традиційні НПЗЗ щодо впливу на ШКТ³

БІОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ
ДОВЕДЕНО*

** Початок анальгезуючої дії вже через 28 хвилин (згідно з інструкцією).

Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні препарати. Коксиди. Код АТХ M01A H05.
1. Таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить еторикоксибу 60 мг або 90 мг, або 120 мг.

Показання. Симптоматична терапія при остеоартриті, ревматоїдному артриті, анкілозуючому спондиліті, а також при болю і ознаках запалення, пов'язаних із гострим подагричним артритом. Нетривале лікування помірного післяопераційного болю, пов'язаного зі стоматологічними операціями. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини. Активна пептична виразка або активна шлунково-кишкова кровотеча. Бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, кропив'янка або алергічні реакції після застосування ацетилсаліцилової кислоти чи НПЗЗ. Період вагітності або годування груддю. Тяжкі порушення функції печінки, нирок. Вік пацієнта до 16 років. Запальні захворювання кишечника. Застійна серцева недостатність (NYHA II-IV). Артеріальна гіпертензія, при якій показання артеріального тиску постійно перевищують 140/90 мм рт. ст. і недостатньо контролюються. Діагнована ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні захворювання. **Побічні реакції.** Розлади метаболізму і харчування: набряки/затримка рідини. З боку серця: відчуття серцебиття, аритмія. З боку судинної системи: артеріальна гіпертензія; порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака, гіпертонічний криз. З боку органів дихальної системи: бронхоспазм. З боку шлунково-кишкового тракту: біль у животі, гастрит. З боку гепатобіліарної системи: підвищення АЛТ, АСТ. Селективні інгібітори ЦОГ-2 були пов'язані зі збільшенням ризику виникнення серйозних артеріальних тромботичних подій, включаючи інфаркт міокарда та інсульт. **Категорія відпуску.** За рецептом. РТ: UA/18626/01/01, UA/18626/01/02, UA/18626/01/03

Наведені нижче дослідження проводилися щодо діючої речовини препарату.

1. Інструкція для медичного використання препарату Форсанек 60 мг, 90 мг, 120 мг. 2. Мальмстром К. та ін. Клін Дж. Біль 2004 Травень-Червень; 20(3):147-55. Malmstrom K, et al. Clin J Pain. 2004 May-Jun; 20(3):147-55. (Тривалість анальгезуючого ефекту, складала >24 годин для еторикоксибу, 20,8 години для напроксену натрію, 3,6 години для ацетамінофену/кодеїну і 1,6 години для плацебо). 3. Доктор Ремей та ін. Частота побічних реакцій з боку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в клінічних дослідженнях еторикоксибу порівняно з неселективними НПЗП: оновлений комбінований аналіз: оновлений комбінований аналіз. [Ramey DR, et al. The incidence of upper gastrointestinal adverse events in clinical trials of etoricoxib vs. non-selective NSAIDs: an updated combined analysis. Curr Med Res Opin. 2005 May; 21(5):715-22].

*Оригінальному препарату еторикоксибу (досьє лікарського препарату Форсанек, data on file).
Зображення таблеток є художнім образом і відрізняється від оригіналу.

Для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах, професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.


Gladpharm

Виробник: Кусум Хелтхекер Пвт Лтд.
Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «Гледфарм ЛТД».
Тел.: (044) 495-82-88.
www.gladpharm.com