

ДІКЛОТОЛ®

ацеклофенак

Ацеклофенак сприяє відновленню хрящової тканини суглобів *1-4



від болю

від запалення



ДІКЛОТОЛ®, гранули. РП UA/12364/02/01. **Склад.** Діюча речовина: ацеклофенак (acedofenac); 1 саше (1 г гранул) містить ацеклофенак 100 мг. **Лікарська форма.** Гранули. **Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні оцтової кислоти та споріднені речовини. Код АТХ M01A B16. **Показання.** Остеоартрит, ревматоїдний артрит, анкілозний спондилоартрит та інші захворювання опорно-рухового апарату, що супроводжуються болем (наприклад, плечолопатковий періартрит та інші позасуглобові прояви ревматизму). При станах, що супроводжуються болем (включно з болем у поперековому відділі, зубним болем, первинною дисменореєю). **Протипоказання.** Гіперчутливість до ацеклофенак, до інших НПЗЗ або до будь-якого допоміжного компонента препарату; напади астми, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк або кропив'янка, спричинені прийомом ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗЗ; пептична виразка або кровотеча, зокрема в анамнезі; гостра кровотеча або захворювання, що супроводжуються кровотечею; застійна серцева недостатність, ІХС, захворювання периферичних артерій; інсульт або епізоди транзиторних ішемічних атак в анамнезі; тяжка печінкова або ниркова недостатність; останній триместр вагітності. **Побічні реакції.** При прийомі НПЗЗ можуть виникати шлунково-кишкові виразки, перфорації або шлунково-кишкові кровотечі. Побічні реакції, про які повідомляли у клінічних дослідженнях, а також при застосуванні препарату Діклотол® (часті, нечасті, поодинокі): анафілактичні реакції (включаючи шок), гіперчутливість, дерматит, кропив'янка, запаморочення, серцева недостатність; артеріальна гіпертензія, диспепсія, біль у животі, нудота, діарея, мелена, шлунково-кишкові виразки, підвищення активності печінкових ферментів, підвищення концентрації сечовини та креатиніну в крові. **Категорія відпуску.** За рецептом.

ДІКЛОТОЛ®, таблетки. РП UA/12364/01/01. **Склад.** Діюча речовина: ацеклофенак (acedofenac); 1 таблетка містить ацеклофенак 100 мг. **Лікарська форма.** Таблетки, вкриті оболонкою. **Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні оцтової кислоти та споріднені речовини. Код АТХ M01A B16. **Показання.** Симптоматична терапія больового синдрому та запалення при остеоартриті, ревматоїдному артриті та анкілозуючому спондиліті, а також інших захворювань опорно-рухового апарату, що супроводжуються болем (наприклад плечолопатковий періартрит або позасуглобовий ревматизм). Як анагетик при станах, що супроводжуються болем (включаючи біль у поперековому відділі, зубний біль і первинну (функціональну) дисменорею). **Протипоказання.** Гіперчутливість до ацеклофенак, до інших НПЗЗ або до будь-якого допоміжного компонента препарату; напади астми, ангіоневротичний набряк або кропив'янка, спричинені прийомом ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗЗ; пептична виразка або кровотеча, в тому числі в анамнезі; гостра кровотеча або захворювання, що супроводжуються кровотечею; застійна серцева недостатність, ІХС, захворювання периферичних артерій; інсульт або епізоди транзиторних ішемічних атак в анамнезі; тяжка печінкова або ниркова недостатність; останній триместр вагітності. **Побічні реакції:** диспепсія, біль у животі, нудота, блювання, мелена, геморагічна діарея, гастроінтестинальна геморагія, шлунково-кишкові кровотечі, перфорації ШКТ, загострення хвороби, корона та виразкового коліту, панкреатит, реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції (включаючи шок), відчуття серцебиття, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, задишка, бронхоспазм, ушкодження печінки (включаючи гепатит), свербіж, висип, дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, нефротичний синдром, запаморочення, парестезія, тремор, сонливість. **Категорія відпуску.** За рецептом.

*Внаслідок сприяння синтезу глікозаміногліканів і гіалуронової кислоти (дані джерел 1 та 3 отримані в експерименті). Дослідження, наведені нижче, проводилися щодо діючої речовини – ацеклофенак.

1. Дінгл Дж. Т. Вплив НПЗП на матрикс суглобових хрящів людини. З Rheumatol/ Z Rheumatol/ 1999;58(3):125-129 [Dingle, J.T. 'The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages.' Zeitschrift fur Rheumatologie vol. 58,3 (1999): 125-9].

2. Рациональні підходи в лікуванні остеоартриту: акцент на ацеклофенак та лорноксикам. О.П. Борткевич. Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 8 (429), квітень 2018 р.

3. Блот Л., Марселіс А., Девогелер Дж.П., Манікорт Д.Х., Вплив диклофенаку, ацеклофенак та мелоксикаму на метаболізм протеогліканів і гіалуронану в остеоартритичному хрящі людини. Британський журнал фармакології. Грудень 2000 року; 131 (7): 1413-21. [Blot L, Marcellis A, Devogelaer JP, Manicourt DH, Effects of diclofenac, aceclofenac and meloxicam on the metabolism of proteoglycans and hyaluronan in osteoarthritic human cartilage. Br J Pharmacol. 2000 Dec; 131 (7): 1413-21.]

4. Ацеклофенак [Електронний ресурс] // DrugBank Canada – Режим доступу до ресурсу: <https://go.drugbank.com/drugs/D806736>. [Acetofenac [Електронний ресурс] // DrugBank Canada – Режим доступу до ресурсу: <https://go.drugbank.com/drugs/D806736>]

Для розповсюдження на спеціалізованих медичних заходах, професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.

Виробник: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд.
Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «Гледфарм ЛТД».
Тел.: (044) 495-82-88,
www.gladpharm.com

Gladpharm